

Fecha de actualización: 05 de agosto de 2025

## Grupo N° 18: Planificación Familiar

### DESOGESTREL

| Clave           | Descripción                                                                                         | Indicaciones                                    | Vía de administración y dosis                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 010.000.2212.00 | <b>TABLETA</b><br><br>Cada tableta contiene:<br>Desogestrel 0.075 mg<br><br>Envase con 28 tabletas. | Anticoncepción.<br><br>Prevención del embarazo. | Oral.<br><br>Adultos:<br>0.075 mg cada 24 horas. |

#### Generalidades

El efecto anticonceptivo de Desogestrel se logra por inhibición de la ovulación y a partir de la ausencia tanto del pico de LH a la mitad del ciclo como del aumento de progesterona durante la fase lútea.

#### Riesgo en el Embarazo

X

#### Efectos adversos

Cefalea, náusea, acné, mastalgia, menstruación irregular, amenorrea, alteración del estado de ánimo, disminución de la libido, aumento de peso.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Conocimiento o sospecha de embarazo, tromboembolismo venoso activo, presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa mientras los valores de la función hepática no se hayan normalizado, tumores progestágeno-dependientes, sangrado vaginal no diagnosticado.

Precauciones: Evaluación individual de la relación beneficio / riesgo en cáncer de mama preexistente y en las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama durante el uso de Desogestrel.

#### Interacciones

Se han identificado interacciones con el uso concomitante de hidantoínas, barbitúricos, primidona, carbamazepina, rifampicina, oxcarbamazepina, rifabutina, troglitazona, felbamato y griseofulvina.

### DESOGESTREL Y ETINILESTRADIOL

| Clave           | Descripción                                                                                                                   | Indicaciones                                    | Vía de administración y Dosis                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3505.00 | <b>TABLETA</b><br><br>Cada tableta contiene:<br>Desogestrel 0.15 mg<br>Etinilestradiol 0.03 mg<br><br>Envase con 21 tabletas. | Anticoncepción.<br><br>Prevención del embarazo. | Oral.<br><br>Adultos:<br><br>Una tableta diaria por la noche a partir del quinto día del ciclo menstrual. |

#### Generalidades

Progestágeno sintético con estrógeno que inhiben la ovulación y modifican el tracto genital, lo que impide la unión de las células germinales.

#### Riesgo en el Embarazo

X

#### Efectos adversos

Náusea, vómito, cefalalgia, nerviosismo, hemorragia intermenstrual, amenorrea, menstruación escasa y de corta duración.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los fármacos, antecedentes o presencia de tumores mamarios, enfermedad hepática, hipertensión arterial sistémica, enfermedad tromboembólica, diabetes mellitus, mujeres fumadoras de más de 35 años de edad.

#### Interacciones

La rifampicina, ampicilina, tetraciclina, cloramfenicol, benzodiacepinas y barbitúricos disminuyen el efecto anticonceptivo.

### ETONOGESTREL

| Clave | Descripción | Indicaciones | Vía de administración y Dosis |
|-------|-------------|--------------|-------------------------------|
|-------|-------------|--------------|-------------------------------|

|                 |                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3510.00 | IMPLANTE                                                                                 | Anticoncepción.          | Subcutánea.                                                                                                                                                             |
|                 | El implante contiene:<br>Etonogestrel 68.0 mg<br><br>Envase con un implante y aplicador. | Prevención del embarazo. | Adultos:<br>Un implante cada tres años. Insertarlo del día 1 al 5 del ciclo menstrual.<br><br>La inserción y remoción deberán efectuarse por un médico con experiencia. |

#### Generalidades

Asociación de progestágeno sintético con estrógeno que inhiben la ovulación y modifican el tracto genital, lo que impide la unión de las células germinales.

#### Riesgo en el Embarazo

X

#### Efectos adversos

Náusea, vómito, cefalalgia, nerviosismo, hemorragia intermenstrual, amenorrea menstruación escasa y de corta duración.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a los fármacos, antecedentes o presencia de tumores mamarios, enfermedad hepática, hipertensión arterial sistémica, enfermedad tromboembólica, diabetes mellitus, mujeres fumadoras de más de 35 años de edad.

#### Interacciones

La rifampicina, ampicilina, tetraciclina, cloramfenicol, benzodiacepinas y barbitúricos disminuyen el efecto anticonceptivo.

## LEVONORGESTREL

| Clave           | Descripción                                                                                                                    | Indicaciones             | Vía de administración y Dosis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.2210.00 | COMPRIMIDO O TABLETA                                                                                                           | Anticoncepción poscoito. | Oral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 | Cada comprimido o tableta contiene:<br>Levonorgestrel 0.750 mg<br><br>Envase con 2 comprimidos o tabletas.                     |                          | Mujeres en edad fértil, incluyendo las adolescentes:<br><br>Un comprimido o tableta. Tomar lo antes posible después de una relación sexual sin protección, y a más tardar dentro de las siguientes 72 horas.<br>Tomar un segundo comprimido o tableta 12 horas después del primero.<br>Ante la presencia de vómito en las 3 horas posteriores a la primera dosis, tomar de inmediato el segundo comprimido o tableta. |
| 010.000.6075.00 | IMPLANTE                                                                                                                       | Anticoncepción           | Subcutáneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Cada implante contiene:<br>Levonorgestrel 75.0 mg<br><br>Envase con 2 implantes y una caja con un trocar e instructivos anexos |                          | Adultos:<br><br>Dos implantes cada 5 años, deberá insertarse dentro de los 7 días siguientes al comienzo de la hemorragia menstrual.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### Generalidades

Levonorgestrel es un progestágeno sintético que modifica la función ovárica, produce un aumento en la densidad del moco cervical y, en consecuencia evita el paso de los espermatozoides hacia el útero. También suprime la actividad endometrial y puede evitar la implantación del blastocito.

#### Riesgo en el Embarazo

X

#### Efectos adversos

Cefalea, nerviosismo, mareos, náuseas, cambios en el patrón menstrual (sangrados menstruales frecuentes, irregulares o prolongados, manchado, amenorrea), cervicitis, secreción vaginal, prurito genital, dolor pélvico, dolor mamario, aumento de peso.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco. Embarazo conocido o sospecha del mismo. Enfermedad tromboembólica venosa activa, presencia o antecedentes de enfermedad hepática severa en tanto los valores de la función hepática no hayan retornado a la normalidad. Presencia o antecedentes de tumores hepáticos (benignos o malignos). Sospecha o certeza de neoplasias malignas dependientes de hormonas sexuales. Hemorragia vaginal sin diagnosticar.

**Precauciones:** Las pacientes con antecedentes de enfermedad tromboembólica sólo deberán usar Levonorgestrel si otros métodos anticonceptivos resultan inadecuados y tras una cuidadosa valoración de la relación riesgo/beneficio. Se debe observar especial cuidado con la prescripción de los implantes de Levonorgestrel a pacientes con factores de riesgo conocidos de enfermedad arterial venosa, o predisposición a la misma. En las pacientes con antecedentes o que desarrollen migraña de tipo focal o progresiva, o con empeoramiento de la migraña durante el uso de Levonorgestrel, deberá evaluarse cuidadosamente la situación. Las usuarias de lentes de contacto que desarrollen cambios de la visión o intolerancia a los mismos deberán ser valoradas por un oftalmólogo. Se le puede aconsejar a la paciente que deje utilizar dichos lentes, bien durante algún tiempo o definitivamente.

#### Interacciones

El efecto de los anticonceptivos hormonales puede verse afectado por medicamentos que inducen enzimas hepáticas, ya que ello podría originar una disminución del efecto anticonceptivo, incluyendo primidona, barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, oxacarbazepina, griseofulvina y no se debe ingerir "hierba de San Juan" (*Hypericum perforatum*).

## LEVONORGESTREL Y ETINILESTRADIOL

| Clave           | Descripción                                                                                                                                                       | Indicaciones                                    | Vía de administración y Dosis                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3504.00 | GRAGEA<br><br>Cada gragea contiene:<br>Levonorgestrel 0.15 mg<br>Etinilestradiol 0.03 mg<br><br>Envase con 21 grageas.                                            | Anticoncepción.<br><br>Prevención del embarazo. | Oral.<br><br>Adultos:<br><br>Una gragea diaria por la noche a partir del quinto día del ciclo menstrual. |
| 010.000.3507.00 | GRAGEA<br><br>Cada gragea contiene:<br>Levonorgestrel 0.15 mg<br>Etinilestradiol 0.03 mg<br><br>Envase con 28 grageas.<br>(21 con hormonales y 7 sin hormonales). |                                                 |                                                                                                          |

#### Generalidades

Asociación de progestágeno con estrógeno que inhibe la ovulación y modifica el tracto genital, lo que impide la unión de las células germinales.

Riesgo en el Embarazo X

#### Efectos adversos

Amenorrea, hemorragia uterina disfuncional, náusea, vómito, cefalalgia, nerviosismo, menstruación escasa y de corta duración.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, antecedentes o presencia de tumores mamarios, enfermedad hepática, diabetes mellitus, enfermedad tromboembólica, hipertensión arterial sistémica, mujeres fumadoras de más de 35 años de edad.

#### Interacciones

La rifampicina, ampicilina, tetraciclina, 3ollicular33l, benzodiacepinas y barbitúricos, disminuyen el efecto anticonceptivo.

## MEDROXIPROGESTERONA Y CIPIONATO DE ESTRADIOL

| Clave           | Descripción                                                                                                                                                                                        | Indicaciones                                    | Vía de administración y Dosis                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3509.00 | SUSPENSIÓN INYECTABLE<br><br>Cada ampolla o jeringa contiene:<br>Acetato de Medroxiprogesterona 25 mg<br>Cipionato de estradiol 5 mg<br><br>Envase con una ampolla o jeringa prellenada de 0.5 mL. | Anticoncepción.<br><br>Prevención del embarazo. | Intramuscular profunda.<br><br>Adultos:<br><br>Primera vez; administrar una ampolla o jeringa entre el primero y el quinto día del ciclo menstrual.<br><br>Segunda vez, administrar al mes después de la primera dosis. |

#### Generalidades

Asociación de progestágeno sintético con estrógeno que inhiben la ovulación y modifica el tracto genital, impidiendo la unión de las células germinales.

**Riesgo en el Embarazo**

X

**Efectos adversos**

Náusea, vómito, hemorragia intermenstrual, amenorrea, cefalea, depresión, tromboflebitis y trastornos tromboembólicos, cloasm a.

**Contraindicaciones y Precauciones**

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, neoplasias estrógeno dependiente o de mama, enfermedad tromboembólica y hepática, diabetes, epilepsia, asma y enfermedad mental, sangrado vaginal no diagnosticado.

**Interacciones**

La rifampicina, ampicilina, tetraciclina, 4ollicular<sup>44</sup>I, benzodiacepinas y barbitúricos, disminuyen el efecto anticonceptivo.

**NORELGESTROMINA-ETINILESTRADIOL**

| Clave           | Descripción                                                                                                            | Indicaciones                                    | Vía de administración y Dosis                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3511.00 | PARCHE<br><br>Cada parche contiene:<br>Norelgestromina 6.00 mg<br>Etinilestradiol 0.60 mg<br><br>Envase con 3 parches. | Anticoncepción.<br><br>Prevención del embarazo. | Cutánea.<br><br>Adultos:<br>Aplicar un parche cada semana, de preferencia el mismo día, durante 3 semanas.<br><br>Dejar una semana sin parche. Cada parche libera 150 µg de norelgestromina y 20 µg de etinilestradiol cada 24 horas. |

**Generalidades**

Actúa a través del mecanismo de supresión de la gonadotropina, mediante las acciones estrogénica y progestacional del etinilestradiol y la norelgestromina. El mecanismo primario de acción es la inhibición de la ovulación, pero también pueden contribuir a la eficacia las alteraciones en el moco cervical, la motilidad de las trompas de Falopio y el endometrio.

**Riesgo en el Embarazo**

X

**Efectos adversos**

Tumores hepáticos benigno y carcinoma; cáncer cervical y de mama; adenomas pituitarios con prolactina. Lesiones neuro-oculares. Infarto al miocardio, migraña, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda, tromboembolia arterial y pulmonar. Colestasis intrahepática y coelitis. Reacción en el sitio de aplicación. Retención de líquidos, cambio en el peso corporal, menor tolerancia a la glucosa. Cambios de estado de ánimo, depresión, irritabilidad, cambios en la libido. Corea inducida por estrógenos. Cambio en la curvatura de la córnea. Náusea, vómito, espasmos y distensión abdominal. Eritema nodoso, prurito, exantema, cloasma, eritema multiforme, acné, seborrea, alopecia. Sangrado intermenstrual, amenorrea, cambio de tamaño de los fibromiomas uterinos, candidiasis vaginal, dismenorrea, mastodinia, galactorrea.

**Contraindicaciones y Precauciones**

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquier componente de este producto. Antecedentes o padecimientos tipo tromboflebitis aguda y trastornos tromboembólicos. Enfermedad cerebrovascular o de las arterias coronarias. Enfermedad cardíaca valvular con complicaciones e hipertensión arterial grave. Diabetes con complicaciones vasculares. Migraña con aura focal. Carcinoma de mama, de endometrio u otro tipo de tumor dependiente de estrógenos. Sangrado genital anormal. Ictericia colestásica del embarazo o con uso previo de anticonceptivos hormonales. Enfermedad hepatocelular aguda o crónica con insuficiencia. Adenomas o carcinomas hepáticos.

Precauciones: Riesgo de embarazo en mujeres obesas con peso mayor de 90 kg. En población con riesgo de padecimientos tromboembólicos arteriales y en insuficiencia renal.

**Interacciones**

La rifampicina, ampicilina, tetraciclina, 4ollicular<sup>44</sup>I, benzodiacepinas y barbitúricos, disminuyen el efecto anticonceptivo. Con la hierba de San Juan, riesgo de embarazo o de sangrados intermenstruales y 4ollicular<sup>4</sup>. Con inhibidores de proteasas virales se modifican los niveles circulantes de las hormonas; el indinavir los aumenta y el ritonavir los disminuye.

**NORETISTERONA Y ESTRADIOL**

| Clave | Descripción | Indicaciones    | Vía de administración y Dosis |
|-------|-------------|-----------------|-------------------------------|
|       |             | Anticoncepción. | Intramuscular profunda.       |

|                 |                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3515.00 | SOLUCIÓN INYECTABLE                                                                                                                                                 |  | <p>Adultos:</p> <p>Administrar una ampolla o jeringa dentro de los primeros 5 días del ciclo menstrual.</p> <p>Posteriormente cada 30 ± 3 días, independientemente del ciclo menstrual.</p> |
|                 | <p>Cada ampolla o jeringa contiene:</p> <p>Enantato de noretisterona 50 mg</p> <p>Valerato de estradiol 5 mg</p> <p>Envase con una ampolla o jeringa con un mL.</p> |  |                                                                                                                                                                                             |

#### Generalidades

Combinación de progestágeno con estrógeno que impide la ovulación al inhibir la secreción de gonadotropinas hipofisiarias y producir cambios en el moco cervical y en la mucosa endometrial.

#### Riesgo en el Embarazo

X

#### Efectos adversos

Náusea, vómito, mastalgia, aumento de peso, cefalea, alteraciones menstruales, cloasma, depresión y tromboflebitis.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, antecedentes de cáncer de mama e hígado, insuficiencia cardíaca. Precauciones: En hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, epilepsia y asma bronquial.

#### Interacciones

Ampicilina, rifampicina, tetraciclina y anticonvulsivantes, disminuyen su efecto anticonceptivo.

## CETROELIX

| Clave           | Descripción                                                                                                                                                                                                       | Indicaciones                                                                     | Vía de administración y Dosis                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.4210.00 | SOLUCIÓN INYECTABLE                                                                                                                                                                                               | Prevención de la ovulación prematura durante la estimulación ovárica controlada. | <p>Subcutánea.</p> <p>Adultos:</p> <p>Dosis a juicio del especialista y de acuerdo con la respuesta terapéutica.</p> |
|                 | <p>El frasco ampolla con liofilizado contiene:</p> <p>Acetato de cetorelix equivalente a 0.25 mg de cetorelix.</p> <p>Envase con un frasco ampolla y jeringa de 1 mL con diluyente.</p>                           |                                                                                  |                                                                                                                      |
| 010.000.4211.00 | <p>SOLUCIÓN INYECTABLE</p> <p>El frasco ampolla con liofilizado contiene:</p> <p>Acetato de cetorelix equivalente a 3.0 mg de cetorelix.</p> <p>Envase con un frasco ampolla y jeringa de 3 mL con diluyente.</p> |                                                                                  |                                                                                                                      |

#### Generalidades

Agonista de la hormona liberadora de gonadotropinas, compete con ésta por los receptores de membrana de las células de la hipófisis.

#### Riesgo en el Embarazo

D

#### Efectos adversos

Ocasionalmente náuseas, cefalea y síndrome de hiperestimulación ovárica.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, menopausia, alteraciones moderadas y severas de la función hepática y renal.

#### Interacciones

Ninguna de importancia clínica.

## FOLITROPINA BETA

| Clave | Descripción         | Indicaciones    | Vía de administración y Dosis |
|-------|---------------------|-----------------|-------------------------------|
|       | SOLUCIÓN INYECTABLE | Anticoncepción. | Subcutánea:                   |

|                 |                                                                                                                     |                                         |                                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| 010.000.4142.00 | Cada frasco ampula con solución contiene:<br>Foliotropina beta 50 UI<br><br>Envase con un frasco ampula con 0.5 mL. | Maduración<br>follicular<br>defectuosa. | Adultos:<br><br>50 UI al día por 7 días. |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|

#### Generalidades

FSH recombinante producida por tecnología de ADN.

#### Riesgo en el Embarazo

C

#### Efectos adversos

Hematoma, enrojecimiento, edema y ardor en el sitio de la aplicación. Hiperestimulación ovárica en el 5%. Aumento en el riesgo de embarazos ectópicos y múltiples. Rara vez trombosis arterial.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, tumores ováricos, de mama, útero, pituitaria o hipotálamo, inflamación de los órganos sexuales, embarazo.

Precauciones: Endocrinopatías no gonadales.

#### Interacciones

Con citrato de clomifeno puede aumentar la respuesta folicular.

## LEVONORGESTREL

| Clave            | Descripción                                                                                                                                                                                                | Indicaciones                                            | Vía de administración y Dosis                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.2208.00  | POLVO<br><br>El dispositivo con polvo contiene:<br>Levonorgestrel (micronizado) 52 mg.<br><br>Envase con un dispositivo.                                                                                   | Anticoncepción.<br><br>Tratamiento de la<br>menorragia. | Intrauterina.<br><br>Adultos:<br>52 mg con periodicidad a juicio del<br>especialista.                                                                             |
| 010.000.7123.000 | SISTEMA DE LIBERACIÓN<br><br>El sistema de liberación contiene:<br>Levonorgestrel (micronizado) 52 mg.<br><br>Envase con un dispositivo de sistema<br>de liberación con membrana de<br>polidimetilsiloxano |                                                         | Intrauterina.<br><br>Adultos:<br>Anticoncepción 52 mg cada 6 a 8 años<br><br>Tratamiento de la menorragia<br>52 mg con periodicidad a juicio del<br>especialista. |
| 010.000.6160.00  | POLVO<br><br>El dispositivo intrauterino con polvo<br>contiene:<br>Levonorgestrel 19.5 mg<br><br>Envase con un dispositivo<br>intrauterino.                                                                | Anticoncepción en<br>mujeres multiparas y<br>nulíparas. | Intrauterino.<br><br>Adultos:<br>Debe colocarse en la cavidad uterina en<br>cualquiera de los 7 días siguientes al inicio<br>de la menstruación hasta por 5 años. |

#### Generalidades

Progestágeno que inhibe la secreción gonadotrópica hipofisiaria, la maduración folicular y forma un moco cervical denso.

#### Riesgo en el Embarazo

X

#### Efectos adversos

Cefalea, dolor abdominal/pélvico, acné/seborrea, cambios en el sangrado menstrual, incluido el aumento o la disminución del sangrado menstrual, goteo, oligomenorrea y amenorrea, quiste ovárico y vulvovaginitis.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: embarazo; enfermedad pélvica inflamatoria aguda o recurrente; o condiciones relacionadas con un riesgo elevado de infecciones pélvicas; Cervicitis o vaginitis aguda; endometritis postparto o aborto infectado durante los últimos tres meses; neoplasia del cuello uterino; malignidad uterina o del cuello uterino; tumores dependientes de progestágeno; sangrado uterino anormal de etiología desconocida; anomalía uterina congénita o adquirida incluidos los fibroides que interfieren con la colocación y/o la retención del sistema intrauterino (es decir si deforman la cavidad uterina); enfermedad hepática aguda o tumor hepático, hipersensibilidad a la sustancia activa o a alguno de los excipientes.

Precauciones: Migraña, migraña focal con pérdida asimétrica de la visión u otros síntomas indicadores de isquemia cerebral transitoria. Cefalea excepcionalmente intensa, ictericia y aumento marcado de la presión arterial, enfermedad arterial grave como por ej. Accidente cerebrovascular o infarto de miocardio.

#### Interacciones

Fármacos que inducen enzimas microsomales, fenitoína, barbitúricos, primidona, carbamazepina, rifampicina, y posiblemente también oxcarbazepina, topiramato, felbamato, griseofulvina, y productos que contienen la hierba de San Juan.

## LINESTRENOL

| Clave           | Descripción                                                                                          | Indicaciones    | Vía de administración y Dosis                                                                                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.4527.00 | <p>TABLETA</p> <p>Cada tableta contiene:<br/>Linestrenol 0.50 mg.</p> <p>Envase con 28 tabletas.</p> | Anticoncepción. | <p>Oral.</p> <p>Adulto:</p> <p>Una tableta por día, sin interrupciones, durante el periodo que se desee evitar el embarazo.</p> |

### Generalidades

Preparado contraceptivo de dosis baja del tipo solo progestágeno, actúa en moco cervical, en endometrio impide la nidación por supresión de la LH, a mitad de ciclo y por ausencia de aumento de progesterona, inhibe la ovulación y la formación de cuerpo lúteo.

### Riesgo en el Embarazo

X

### Efectos adversos

Sangrado intermenstrual, amenorrea postmedicación, hipersensibilidad mamaria, náusea, vómito, coleditiasis, hipertensión arterial, trombosis, cloasma, rash, cefalea, retención de líquidos, cambios de peso corporal.

### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, antecedentes o enfermedad hepática grave, antecedentes de ictericia durante el embarazo o por uso de esteroides, sangrado vaginal sin diagnosticar, prurito grave en gestación.

### Interacciones

Con anticonvulsivos, barbitúricos, rifampicina, carbón activado y ciertos laxantes, pueden presentarse hemorragias irregulares y disminución de la confiabilidad anticonceptiva. Disminuye la tolerancia a la glucosa y aumenta la necesidad de hipoglucemiantes orales.

## NORETISTERONA

| Clave           | Descripción                                                                                                                                 | Indicaciones                                           | Vía de administración y Dosis                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.3503.00 | <p>SOLUCIÓN INYECTABLE OLEOSA</p> <p>Cada ampolla contiene:<br/>Enantato de noretisterona 200 mg</p> <p>Envase con una ampolla de 1 mL.</p> | <p>Anticoncepción.</p> <p>Prevención del embarazo.</p> | <p>Intramuscular profunda.</p> <p>Adultos:</p> <p>Una ampolla cada dos meses, en los primeros días del ciclo menstrual.</p> |

### Generalidades

Progestágeno sintético que bloquea los mecanismos de secreción gonadotrópica hipofisiaria y modifica el moco cervical.

### Riesgo en el Embarazo

X

### Efectos adversos

Amenorrea, hemorragia uterina disfuncional, náusea, vómito, cefalalgia, aumento de peso, dolor en el sitio de aplicación, nerviosismo.

### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, tumores mamarios, enfermedad hepática, enfermedad tromboembólica, diabetes mellitus, hipertensión arterial, mujeres fumadoras de más de 35 años de edad.

### Interacciones

La rifampicina disminuye los efectos de progestágenos.

## PROGESTERONA

| Clave           | Descripción                                                                                        | Indicaciones                                              | Vía de administración y Dosis                                                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 010.000.4207.00 | <p>GEL</p> <p>Cada aplicador contiene:<br/>Progesterona 90 mg</p> <p>Envase con 6 aplicadores.</p> | <p>Mastopatía benigna.</p> <p>Mastalgia y mastodinia.</p> | <p>Cutánea en glándula mamaria.</p> <p>Adultos:</p> <p>Aplicar la cuarta parte del gel de 1 aplicador (22.5 mg) en la glándula mamaria afectada, diariamente.</p> |

|  |  |  |                                                     |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  |  |  | Duración del tratamiento a juicio del especialista. |
|--|--|--|-----------------------------------------------------|

#### Generalidades

La progesterona aplicada localmente en la glándula mamaria, se distribuye y disemina por el tejido adiposo para tratar y prevenir los efectos vasculares y celulares provocados por un déficit de progesterona a nivel de los senos, suspendiendo el aumento de la permeabilidad capilar, la hidratación del tejido conectivo, la estimulación y diferenciación del epitelio galactóforo, bloqueando la rápida actividad mitótica epitelial y la formación de acinos glandulares.

#### Riesgo en el Embarazo

B

#### Efectos adversos

Rash cutáneo en los sitios de aplicación.

#### Contraindicaciones y Precauciones

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al fármaco, procesos malignos y mujeres menores de 12 años.

#### Interacciones

Ninguna de importancia clínica.