

ENMP-IMSS

*Encuesta de percepción sobre
algunos aspectos de medicina
preventiva*

PREVENIMSS

*Acciones de carácter preventivo para
mejorar la salud de los derechohabientes*

DIRECCION DE PLANEACION PARA LA
TRANSFORMACION INSTITUCIONAL

CIE-noviembre 2021

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. SISTEMA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DEL IMSS (SPS-IMSS)	4
2. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA	5
3. PRINCIPALES RESULTADOS ENMP-IMSS.....	6
4. METODOLOGÍA	7
5. PERFIL DE LOS USUARIOS Y MOTIVOS DE ATENCIÓN	12
6. PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL IMSS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y COMENTARIOS	17
7. NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA.....	23
8. PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE PREVENIMSS	26
9. PERCEPCIÓN SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA SALUD DE LOS DH Y HABITANTES DEL PAÍS.....	32
11. ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR.....	50
12. PERCEPCIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN DEL COVID Y ACCIONES PREVENTIVAS.....	55
13. ALGUNAS CONCLUSIONES.....	63

INTRODUCCIÓN

Este informe presenta los resultados que se obtuvieron de la aplicación de la Encuesta Nacional sobre Medicina Preventiva IMSS 2021 (ENMP-IMSS) en su modalidad en línea, utilizando la herramienta *SurveyMonkey*, con el apoyo de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

En 2021 se levantó la medición con esta encuesta abordando algunos temas sobre medicina preventiva y se obtiene información por primera vez, sobre aspectos relacionados con acciones de prevención y cuidado de la salud por parte de los usuarios de los servicios médicos del IMSS, así como su percepción sobre el servicio de PREVENIMSS brindado por el Instituto en unidades médicas de primer nivel de atención.

La encuesta se aplicó del 14 al 30 de septiembre, bajo la modalidad en línea. Se envió la invitación por correo electrónico a 555,530 personas que hicieron uso del servicio de consulta médica del IMSS en sus tres niveles de atención y que dieron una dirección de correo electrónica, en los meses de mayo y septiembre de 2021. Este estudio de percepción social permite además tener una primera aproximación detallada sobre las acciones de las personas en el cuidado de su salud, así como información relacionada con la vacunación contra Covid-19.

1. SISTEMA DE PERCEPCIÓN SOCIAL DEL IMSS (SPS-IMSS)

En la percepción social, intervienen valores, normas, juicios, sentimientos y opiniones tanto de aquellos que reciben los servicios institucionales como de los que los prestan. Y deben formar parte de esta estructura conceptual y metodológica todos aquellos estudios donde se toma en cuenta la opinión de cada uno de los participantes y beneficiarios de la seguridad social.

¿Cómo vive y percibe un usuario que asiste a una unidad médica del IMSS los diferentes momentos en una atención médica? ¿Cómo siente esa atención y qué le queda en su mente, para poder expresar a través de un juicio esa sensación de espera, de trato, de resolución (diagnósticos, estudios, medicamentos)? Al llegar a su hogar ¿los recuerdos permanecen en su mente sobre la atención recibida? ¿Cómo se pueden evaluar a través de opiniones y/o juicios en un instrumento que ordena en una serie de reactivos, integrados en un cuestionario para captar información de las vivencias de los usuarios? Información que se procesa y se analiza para integrar un informe y que permite a la institución comprender no solamente los resultados cuantitativos sino contar con la voz de los derechohabientes y sus sensaciones que son elementos para tener servicios de salud cada vez más humanitarios.

De esta manera la Dirección de Planeación para la Transformación Institucional (DPTI), a través de la Coordinación de Investigación Estratégica (CIE), tiene como un objetivo prioritario el diseño e implantación de un Sistema de Percepción Social del IMSS (SPS - IMSS), para analizar de forma integral las distintas visiones de la percepción en diferentes ámbitos.

El SPS-IMSS permitirá contar con mediciones subjetivas de los involucrados en la prestación de los servicios e identificar áreas de oportunidad de manera integral, y que sean uno de los insumos para la Dirección General y Áreas Normativas en el diseño y ejecución de estrategias de mejora continua en términos de lograr servicios humanitarios, hacer más eficientes los tiempos de atención y el incremento en la percepción del trato en el IMSS para los (las) usuarios(as), así como para incluir otros temas de opinión relevantes.

Los resultados de la Encuesta de Percepción sobre algunos aspectos de Medicina Preventiva son uno de los componentes de este Sistema (SPS-IMSS).

2.- OBJETIVOS DE LA ENCUESTA


- Conocer el grado de satisfacción de las personas encuestadas con los servicios que reciben en las Unidades Médicas del IMSS.
- Integrar las opiniones de las personas encuestadas particularmente con el servicio de PREVENIMSS.
- Identificar las acciones que llevan a cabo las personas encuestadas para el cuidado de su salud, así como de detección de enfermedades crónicas.
- Conocer la opinión de las personas encuestadas sobre la vacunación contra el Covid-19, así como las acciones que llevan a cabo para evitar el contagio.
- Analizar el conocimiento de los DH sobre los logros y problemáticas del Instituto.

3. PRINCIPALES RESULTADOS ENMP-IMSS

- El 61% de las personas encuestadas dijeron estar muy satisfechas o satisfechas con la atención recibida en su visita a la unidad médica, dos puntos porcentuales menos con respecto a la encuesta de Imagen Institucional.
- La satisfacción de las personas encuestadas con el servicio de PREVENIMSS fue de 59%, en tanto que 12% dijo estar muy insatisfecho o insatisfecho y 6% mencionó que no ha utilizado este servicio.
- A nivel nacional, 46% de las personas encuestadas solicitaron atención en el servicio de PREVENIMSS en los últimos 6 meses.
- El 71% opinó que el proceso para ser atendido en PREVENIMSS es excelente o bueno, en tanto que 21% dijo que es regular y 9% que es malo o pésimo.
- A nivel nacional, el 61% calificó como muy efectivo o efectivo el servicio de PREVENIMSS, con respecto a la detección temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad.
- El 68% de los encuestados dijo tener el esquema completo de vacunación contra Covid-19.
- En el último mes, al menos el 92% de las personas encuestadas han aplicado en su hogar o rutina diaria el lavado de manos, el uso de cubrebocas, la vacunación, el distanciamiento social y el uso de gel antibacterial, como medidas preventivas contra el Covid-19.
- Por otra parte, el 50% de las y los encuestados dijeron que subieron de peso durante el confinamiento por la contingencia sanitaria por Covid-19.
- Al 52% de las personas encuestadas algún médico les ha señalado que tienen sobrepeso u obesidad; en contraparte, solo al 21% le han dicho que tienen diabetes.
- En el último mes, 44% de las personas encuestadas se han sentido nerviosas o estresadas muy a menudo o a menudo.
- En cuanto a los miembros del hogar de las personas encuestadas, al menos el 50% dijo que alguno de ellos ha sido diagnosticado con diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad. De estos, solo 56% mencionó que dichos miembros están llevando acciones para controlar su peso.

4. METODOLOGÍA

ENMP-IMSS. Mapa 1 Distribución de las encuestas analizadas por OOAD



4.1 Diseño muestral

La Encuesta Nacional sobre Medicina Preventiva IMSS 2021 (ENMP-IMSS), se considera un estudio no probabilístico, pero permite organizar resultados para tener una visión a nivel nacional, por OOAD, nivel de atención y otras categorías de análisis para las personas usuarias con correo electrónico.

El marco muestral, se conformó con el catálogo de las personas usuarias con correo electrónico que hicieron uso del servicio de consulta médica del IMSS, en sus tres niveles de atención, entre mayo y septiembre de 2021, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la Coordinación de Planeación en Salud, de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS.

Los derechohabientes usuarios que acudieron a consulta que contaba con correo electrónico registrado fueron 1'072,889. En un subconjunto de los correos recibidos, se realizó una identificación de manera pormenorizada de correos válidos. Posteriormente se implementó un algoritmo de Deep Learning para validación en Python con la biblioteca Flair. Esto permitió predecir los correos electrónicos a partir del primer etiquetado. El entrenamiento del algoritmo se realizó de manera iterativa. Después de la tercera iteración, se logró reducir considerablemente la cantidad de errores que el algoritmo cometía, llegando a una identificación de correos no válidos con una precisión superior al 95%.

Para la selección de las personas usuarias se estratificó, por OOAD (35 OOAD) y por nivel de atención (primer y segundo nivel). En el caso de tercer nivel, se conformó un solo estrato. La probabilidad de selección de las personas que se encuestaron está dada por la siguiente ecuación:

$$P[D_{ih}] = \frac{n_h}{N_h}$$

Donde:

$P[D_{ih}]$ es la probabilidad de selección del usuario(a) i a encuestar dentro del estrato h .

n_h es el número de personas a encuestar en el estrato h .

N_h es el número total de usuarios(as) con correo electrónico que recibieron atención de consulta en sus tres niveles de atención entre mayo y septiembre de 2021, en el estrato h .

Los tamaños de muestra por OOAD (primer y segundo nivel) se estimaron con una sobre muestra por no respuesta. Para esto, se utilizaron los resultados del levantamiento ENCAL Servicios de Salud 2020. Para el caso de tercer nivel, se calculó una muestra específica, la fórmula utilizada fue la misma.

4.2 Cuestionario

El cuestionario está conformado por 54 preguntas, divididas en 9 secciones, además de los datos de identificación de la unidad médica:

- Motivo de la atención y satisfacción con la atención médica (3 preguntas).
- Datos generales de la persona encuestada (5 preguntas).
- Diagnóstico y vacunación contra Covid-19 (5 preguntas).
- PREVENIMSS (10 preguntas).
- Actividad física (4 preguntas).
- Servicios preventivos (12 preguntas).
- Otros factores de salud (2 preguntas).
- Diabetes e hipertensión de miembros del hogar (5 preguntas).
- Acciones preventivas Covid-19 (1 pregunta).
- Imagen del IMSS (7 preguntas).

4.3 Levantamiento de información

ENMP-IMSS. Cuadro 1. Marco de muestreo de usuarios, encuestas analizadas y unidades médicas.

Clave OOAD		Personas usuarias con correo electrónico	Correos validados	Correos enviados	Encuestas analizadas	% de efectividad	Unidades con correos enviados a las personas usuarias	Unidades con encuestas analizadas
2	Baja California	20,165	16,971	16,403	903	5.50%	33	26
3	Baja California Sur	2,207	1,499	1,423	80	5.60%	18	13
6	Chihuahua	39,876	26,142	24,571	880	3.60%	42	33
28	Sonora	12,289	10,424	9,975	240	2.40%	54	32
21	Nuevo León	166,227	144,917	36,182	1,422	3.90%	52	45
30	Tamaulipas	79,773	70,872	44,971	1,007	2.20%	31	24
7	Coahuila	19,178	16,666	16,003	679	4.20%	45	36
Zona 1	7 OOAD´s	339,715	287,491	149,528	5,211	3.5	275	209
17	Jalisco	35,827	26,025	24,892	1,614	6.50%	91	62
18	Michoacán	4,711	2,465	2,244	146	6.50%	28	15
20	Nayarit	1,032	722	680	42	6.20%	21	11
8	Colima	2,390	1,630	1,523	116	7.60%	12	9
11	Durango	39,599	34,542	31,850	847	2.70%	27	16
35	Zacatecas	8,317	6,642	6,333	228	3.60%	30	15
27	Sinaloa	13,408	8,274	7,539	184	2.40%	35	15
Zona 2	7 OOAD´s	105,284	80,300	75,061	3,177	4.2	244	143
32	Veracruz Norte	40,811	30,187	27,752	1,009	3.60%	45	32
26	San Luis Potosí	5,810	3,168	2,882	146	5.10%	26	16
24	Querétaro	14,847	12,365	11,926	495	4.20%	21	16
1	Aguascalientes	29,858	24,940	23,420	1,139	4.90%	16	16
14	Guanajuato	29,480	23,018	21,754	1,009	4.60%	38	26
31	Tlaxcala	1,835	1,611	1,546	41	2.70%	17	10
23	Puebla	50,846	39,839	30,916	1,240	4.00%	38	26
16	Hidalgo	23,339	19,928	19,120	884	4.60%	22	22
19	Morelos	4,907	3,801	3,633	235	6.50%	20	9

Zona 3	10 OOAD´s	201,733	158,857	142,949	6,198	4.3	243	173
9	CDMX Norte	108,656	94,026	23,098	1,630	7.10%	31	31
10	CDMX Sur	96,147	81,833	31,122	2,938	9.40%	44	44
12	México Oriente	96,594	84,383	34,587	2,138	6.20%	52	48
13	México Poniente	34,968	28,970	27,580	1,655	6.00%	48	42
Zona 4	4 OOAD´s	336,365	289,212	116,387	8,361	7.2	175	165
22	Oaxaca	7,130	5,963	5,794	213	3.70%	21	16
15	Guerrero	5,032	4,206	4,017	167	4.20%	14	10
33	Veracruz Sur	8,063	6,254	5,797	196	3.40%	40	25
34	Yucatán	39,286	35,309	31,486	1,067	3.40%	27	22
25	Quintana Roo	8,950	7,739	7,478	259	3.50%	15	10
4	Campeche	2,574	1,748	1,675	107	6.40%	13	10
5	Chiapas	2,855	1,848	1,782	100	5.60%	17	10
29	Tabasco	15,902	14,213	13,576	467	3.40%	22	17
Zona 5	8 OOAD´s	89,792	77,280	71,605	2,576	3.6	169	120
	Total	1,072,889	893,140	555,530	25,523	4.60%	1106	810

El cuadro anterior, muestra la distribución de las personas usuarias con correo electrónico, que representan más de un millón, de los cuales después de un proceso de validación y selección se enviaron a más de medio millón con el cuestionario anexo y se tuvo una respuesta de poco más de 25 mil entrevistas, esto es el 4.6%. Destacan en su porcentaje de respuesta: CDMX Sur con 9.4%, Colima 7.6% y CDMX Norte con 7.1%. Se obtuvieron bajos porcentajes de respuesta en Tlaxcala, Baja California Sur y Nayarit producto de que los correos proporcionados para esas OOAD´s no fueron lo suficientemente numerosos para obtener una mayor respuesta, comparados con el resto de estos organismos. También se presenta una agrupación de las respuestas por zonas del país y que sirven para observar en que zona se produce una mayor participación y lo cual es una referencia, para afinar aspectos metodológicos en otros estudios de percepción social.

4.4 Procesamiento de la información

Al concluir el periodo de levantamiento, la DIDT entregó a la CIE la base de datos generada por el servicio *Survey Monkey* en formato CSV. Posterior a esto, se realizó el etiquetado de variables y asignación de códigos a las categorías de respuesta.

De esta manera el procesamiento se efectuó utilizando paquetería estadística, así como tablas dinámicas de Excel. Se generaron frecuencias para cada una de las variables y se integraron cruces de información con diferente grado de agregación.

4.5 Limitaciones

La encuesta sólo considera la percepción de las personas usuarias de consulta de medicina familiar o de especialidades sobre la calidad de los servicios médicos del IMSS, que contaban con correo electrónico registrado, por lo que no se tendrá la percepción de las personas que carecen de él. Además, puede existir las siguientes limitaciones:


Sesgo por temporalidad: Las personas usuarias acudieron a consulta médica entre mayo y septiembre de 2021 y el levantamiento se realizó del 14 al 30 de septiembre de 2021, por lo que se apeló a su buena memoria para compartir su percepción del servicio acorde con lo que vivió.

Alta tasa de No Respuesta: Los levantamientos de información mediante medios electrónicos suelen presentar una alta tasa de No Respuesta y esto puede producir sesgos en la presentación de los datos, sobre todo cuando se utilizan ciertos desgloses geográficos.

Falta de factores de expansión: Al no calcularse factores de expansión, se dificulta el ilustrar cómo los resultados obtenidos se extienden a toda la población analizada. Sin embargo, un ejercicio realizado con 16 000 entrevistas que se consideran completas se encontraron resultados similares a los que se presentan sin el uso de factores de expansión.

5.- PERFIL DE LOS USUARIOS Y MOTIVOS DE ATENCIÓN

ENMP-IMSS. Mapa 2 Distribución del tipo de atención que solicitó (nivel de atención al que acudió) por OOAD



5.1 Perfil de los usuarios

Más de la mitad (65%) de las personas encuestadas del servicio de consulta externa fueron mujeres. Por grupos de edad, 68% se concentró entre los 26 y 54 años. (Cuadro 2)

ENMP-IMSS. Cuadro 2. Distribución porcentual de las personas encuestadas por sexo y rango de edad^{1/2}

Sexo	Porcentaje
Hombre	35%
Mujer	65%
Edad	Porcentaje
18-25	10%
26-34	22%
35-44	24%
45-54	22%
55-64	13%
65 y más	9%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En cuanto al tipo de consulta a la que acudieron, la proporción de mujeres en los tres niveles de atención fue muy similar, entre el 65% y 67%. Por grupos de edad, en los tres niveles más del 60% de las personas encuestadas tienen entre 26 y 54 años, siendo mayor el porcentaje en el grupo de edad de 35 a 44 años, en unidades de segundo nivel, con 28% (cuadro 3). Es importante señalar que el número de usuarios del tercer nivel de atención es menor, ya que solamente se cuenta con 25 UMAE distribuidas en 11 OOAD.

ENMP-IMSS. Cuadro 3. Distribución porcentual por tipo de consulta a la que la persona encuestada acudió en su última visita a la unidad médica por sexo y rango de edad^{1/2/3}

Sexo	Unidad de Medicina Familiar o Clínica	Hospital de segundo nivel	Hospital de tercer nivel o alta especialidad
Hombre	35%	34%	33%
Mujer	65%	66%	67%
Edad	Unidad de Medicina Familiar o Clínica	Hospital de segundo nivel	Hospital de tercer nivel o alta especialidad
18-25	10%	8%	8%
26-34	22%	21%	24%
35-44	24%	28%	25%
45-54	22%	22%	23%
55-64	14%	12%	12%
65 y más	9%	8%	9%


1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. Los hospitales de tercer nivel se encuentran sólo en Coahuila, CDMX Sur, CDMX Norte, México Poniente, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora, Veracruz Norte y Yucatán

A nivel nacional, 69% de las y los encuestados tienen 10 años o más de ser derechohabientes del IMSS (Gráfica 1). Sin embargo, como esta encuesta es anónima no es posible vincular a estos derechohabientes con su historial de visitas o su experiencia utilizando los servicios de la institución, pero sin duda pueden aportar o sugerir juicios sobre su percepción de la atención recibida.

ENMP-IMSS. Gráfica 1. Distribución porcentual del tiempo que la persona encuestada es derechohabiente, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Los principales motivos o problemas de salud (Cuadro 4) por los que acudieron a solicitar atención son lo que señala de manera verbal el DH y con esto se realizan agrupaciones para sintetizar los motivos de asistencia a una unidad médica. De esta manera estos motivos se reagruparon en 4 categorías: Prevención, Control, Atención de enfermedades y otros.

Dentro del concepto de control, destacan hipertensión con 13%, seguido por control de diabetes con 9%. Para segundo y tercer nivel se acudió principalmente por accidentes (golpes, caídas, etc.), en ambos con 8%.

ENMP-IMSS. Cuadro 4. Distribución porcentual de los motivos o problemas de salud por el que las personas acudieron a solicitar atención en su última visita a la unidad médica por nivel de atención^{1/2/3}

Motivo o problema de salud	Nacional	Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel
Prevención	18.0%	19.0%	10.2%	9%
Acciones preventivas (toma de presión arterial, glucosa, colesterol, Papanicolaou, exploración de mama, tamiz neonatal, agudeza visual, vacunas y detección de VIH en embarazadas)	13.0%	14.0%	7.0%	5%
Revisión mensual, bimestral o trimestral	4.0%	4.0%	3.0%	4%
Planificación familiar/Biología de la reproducción	1.0%	1.0%	0.2%	
Control	25.0%	27.0%	10.0%	4.00%
Control de hipertensión	13.0%	14.0%	3.0%	1%
Control de diabetes	9.0%	10.0%	3.0%	1%
Control de embarazo	2.0%	2.0%	3.0%	2%
Control del niño sano	1.0%	1.0%	1.0%	0.40%
Atención de Enfermedades	42.0%	44.0%	60.0%	64%
Accidentes (golpes, caídas, etc.)	5.0%	5.0%	8.0%	8%

Motivo o problema de salud	Nacional	Primer nivel	Segundo nivel	Tercer nivel
Medicamentos (enfermedades crónicas)	5.0%	5.0%	1.0%	2%
Problemas respiratorios (tos, gripa, temperatura elevada, etc.)	3.0%	4.0%	3.0%	2%
Sospecha COVID o COVID	3.0%	4.0%	3.0%	1%
Trámite de incapacidad por otro padecimiento	3.0%	3.0%	4.0%	3%
Atención psiquiátrica/psicológica/salud mental/Trastornos neurológicos	2.0%	2.0%	3.0%	4%
Enfermedad tiroidea	2.0%	2.0%	3.0%	3%
Atención médica sin especificar (chequeo general)	2.0%	2.0%	2.0%	3%
Trámite de incapacidad por COVID o sospecha de COVID	1.0%	2.0%	0.5%	1%
Cirugía/postcirugía/preoperatoria	1.0%	1.0%	7.0%	7%
Enfermedades gástricas e intestinal (colitis)	1.0%	1.0%	2.0%	2%
Ginecología	1.0%	1.0%	4.0%	3%
Afecciones de la columna, cadera, rodilla, espalda	1.0%	1.0%	2.0%	1%
Enfermedad articular	1.0%	1.0%	2.0%	1%
Enfermedades urológicas/prostáticas	1.0%	1.0%	2.0%	2%
Realización, resultados y/o revisión de estudios de laboratorio, rayos x, tomografías, etc.	1.0%	1.0%	3.0%	3%
Otorrinolaringología (Rinitis o Sinusitis/Problemas auditivos/Afecciones en el oído/Enfermedades de garganta)	1.0%	1.0%	1.0%	2%
Patología de riñones	1.0%	1.0%	2.0%	4%
Asma	1.0%	1.0%	0.2%	0.30%
Enfermedades del corazón	1.0%	1.0%	2.0%	3%
Enfermedades oftalmológicas/oculares (conjuntivitis, glaucoma)	1.0%	1.0%	1.0%	2%
Cáncer	1.0%	0.3%	2.0%	5%
Alergias	1.0%	1.0%	1.0%	1%
Dolor de cabeza o cefalea sin otra manifestación	1.0%	1.0%	0.3%	
Trastorno lipídico	1.0%	1.0%	0.5%	1%
Otras	9.1%	7.3%	18.0%	13%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Respecto a la forma como asisten a recibir un servicio en una unidad médica, 20% de las encuestadas/os manifiestan que son acompañadas/os para acudir a su atención médica (Cuadro 5). Por sexo se observaron proporciones casi similares, 19% y 21% para hombres y mujeres respectivamente.

ENMP-IMSS. Cuadro 5. Distribución porcentual de las personas que requirieron o no ser acompañados para acudir a consulta por sexo y rango de edad^{h/2}

Sexo	Sí	No
Total	20%	79%
Hombre	19%	81%
Mujer	21%	78%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En cuanto a grupos de edad, 26% de las personas encuestadas de entre 18 y 25 años, y 39% de 65 años o más también requirieron de ser acompañados para acudir a su consulta. Llama la atención el 26 % de los más jóvenes cuya proporción es mayor que el resto de las edades. (Cuadro 6)


ENMP-IMSS. Cuadro 6. Distribución porcentual de las personas que requirieron o no ser acompañados para acudir a consulta por sexo y rango de edad^{h/2}

Sexo	Edad	Sí	No
Hombre	18-25	24%	76%
	26-34	19%	80%
	35-44	17%	82%
	45-54	15%	85%
	55-64	15%	84%
	65 y más	31%	69%
Mujer	18-25	27%	72%
	26-34	21%	79%
	35-44	20%	80%
	45-54	15%	85%
	55-64	17%	83%
	65 y más	50%	49%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo o a que no se muestra la no respuesta, la cual va de 0.07% a 0.75%
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

6.- PERCEPCIÓN SOBRE LA IMAGEN DEL IMSS, SUGERENCIAS, QUEJAS Y COMENTARIOS


ENMP-IMSS. Mapa 8. Comparación del servicio del IMSS con respecto a otras instituciones de salud por OOAD



6.1 Percepción de trato igualitario

Para el 80% de las y los encuestados, el trato brindado en las unidades médicas del IMSS es igualitario para hombres y mujeres. (Gráfica 2)

ENMP-IMSS. Gráfica 2. Distribución porcentual de la percepción de trato igualitario a hombres y mujeres en las unidades médicas del IMSS Nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

También al analizar esta variable por sexo, el porcentaje de hombres y mujeres que creen que en las unidades médicas del IMSS sí se brinda un trato igualitario a ambos sexos, es muy similar, con 81% y 80% respectivamente.

6.2 Comparación del IMSS con otras instituciones de salud

El 20% de las personas opinan que el servicio del IMSS es mejor que en otras Instituciones de salud; sin embargo, el 18% opina que el servicio es peor, en tanto que para el 35% no hay diferencia. (Gráfica 3)

ENMP-IMSS. Gráfica 3. Distribución porcentual de la comparación del servicio del IMSS con respecto a otras instituciones de salud, nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

6.3 Percepción de la situación actual y el futuro del IMSS

69% de las personas encuestadas dijeron estar totalmente de acuerdo y/o de acuerdo con que el IMSS extienda sus servicios médicos a otras poblaciones del país, aunque no estén asegurados. (Gráfica 4)

ENMP-IMSS. Gráfica 4. Distribución porcentual de la opinión de las personas encuestadas sobre que el IMSS extienda sus servicios médicos a otras poblaciones del país, aunque no estén asegurados, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Desglosando los resultados por el tiempo que las personas encuestadas han sido derechohabiente, 81% de las personas que tienen menos de un año afiliadas al IMSS están totalmente de acuerdo y/o de acuerdo con que el Instituto extienda sus servicios de salud a otras poblaciones, aunque no estén asegurados; esta postura disminuye conforme aumenta la antigüedad de la derechohabencia. (Cuadro 7)

ENMP-IMSS Cuadro 7. Distribución porcentual de la opinión de las personas encuestadas sobre que el IMSS extienda sus servicios médicos a otras poblaciones del país, aunque no estén asegurados por el tiempo que han sido derechohabientes, nacional^{1/2/3/4}


Tiempo de derechohabencia	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Menos de 1 año	52%	29%	10%	5%	2%
Un año a menos de 5 años	46%	29%	12%	7%	3%
5 años a menos de 10 años	43%	29%	13%	8%	4%
10 años o más	40%	28%	11%	11%	6%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. A nivel nacional la no respuesta en el tiempo de derechohabencia fue de 3%. De los encuestados que no especificaron el tiempo siendo derechohabientes, 70% manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo con extender los servicios y solo 10% está en desacuerdo.
4. La no respuesta en la opinión sobre si el IMSS debiese extender sus servicios fue menor al 4% en cada rango de tiempo de derechohabencia

Por otra parte, a nivel nacional el 11% de las personas encuestadas recuerdan el nombre del actual director general del IMSS.

Entre los principales logros del IMSS, el 7% de las personas encuestadas mencionó como principal el de Garantizar el Bienestar y Acceso a la Salud, así como la calidad de la atención y el servicio 5%. (Gráfica 5)

ENMP-IMSS. Gráfica 5. Distribución porcentual de lo que perciben las personas encuestadas como el principal logro del IMSS, nacional^{1/2}



1. Las cifras no suman 100% debido al redondeo y a que no se presenta la No respuesta alrededor del 8%.
 2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

35% de las y los encuestados perciben la mala atención médica o mal trato como el principal problema del IMSS para proporcionar servicios de salud de calidad y así cumplir con las expectativas de las personas usuarias. En segundo

lugar, **está la falta de medicamentos**, medicamentos de baja calidad o falta de vacunas, con 17%. (Gráfica 6)

ENMP-IMSS. Gráfica 6. Distribución porcentual de lo que perciben las personas encuestadas como el principal problema del IMSS para proporcionar servicios de salud de calidad y que cumpla con las expectativas de los(as) usuarios(as), nacional^{1/2/3}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3.- Solamente se procesan las preguntas donde se identificó una problemática, en alrededor del 70% de los encuestados.


7. NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD MÉDICA

ENMP-IMSS. Mapa 3. Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas encuestadas con la atención recibida en su última visita a la unidad médica por OOAD



Las personas encuestadas que dijeron estar muy satisfechas o satisfechas con la atención recibida en su visita a la unidad médica se ubicaron en 61%, dos puntos porcentuales menos con respecto a la encuesta de Imagen Institucional. Esta proporción se ha visto disminuida a partir de 2020, con la aparición de la pandemia, durante 2019 alcanzó un 87%, en 2020 registró 69%, a principios de este año 63% y con esta última encuesta se situó en 61%. (Gráfica 7)

ENMP-IMSS. Gráfica 7. Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas encuestadas con la atención recibida en su última visita a la unidad médica, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Por nivel de atención (Cuadro 8), se observa que las personas encuestadas de tercer nivel registraron el porcentaje más alto de satisfacción general con la atención recibida, con 66%. Segundo nivel registró el porcentaje más bajo, con 58%.

ENMP-IMSS. Cuadro 8. Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas usuarias con la atención recibida en su última visita a la unidad médica por nivel de atención, nacional^{1/2}

Nivel	Muy satisfecho(a)	Satisfecho(a)	Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)	Insatisfecho(a)	Muy insatisfecho(a)
Total	23%	38%	14%	13%	11%
Primer nivel	22%	38%	15%	14%	11%
Segundo nivel	24%	34%	14%	14%	13%
Tercer nivel	32%	34%	14%	10%	9%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Por otra parte, no se observa una diferencia importante en la satisfacción con los servicios entre los encuestados que tienen poco tiempo (menos de 1 año) de ser derechohabientes con aquellos de más tiempo afiliados (10 años o más). (Cuadro 9)


ENMP-IMSS. Cuadro 9. Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas usuarias con la atención recibida en su última visita a la unidad médica por el tiempo que llevan de derechohabientes del IMSS, nacional. ^{1/2/3}

Tiempo de derechohabencia	Muy satisfecho(a)	Satisfecho(a)	Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)	Insatisfecho(a)	Muy insatisfecho(a)
Menos de 1 año	21%	42%	16%	11%	9%
Un año a menos de 5 años	19%	37%	19%	13%	11%
5 años a menos de 10 años	21%	37%	17%	13%	12%
10 años o más	25%	39%	13%	13%	10%

1. A nivel nacional la no respuesta en el tiempo de derechohabencia fue de 3%. De estos usuarios, el 58% está muy satisfecho o satisfecho con la atención recibida.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

8. PERCEPCIÓN SOBRE EL SERVICIO DE PREVENIMSS


ENMP-IMSS. Mapa 4. Distribución porcentual del nivel de conocimiento del servicio de PREVENIMSS por OOAD



8.1 Satisfacción con el servicio de PREVENIMSS

La satisfacción de las personas encuestadas con el servicio de PREVENIMSS a nivel nacional registró 15% muy satisfecho y 44% en la categoría de satisfecho, respectivamente. En contraparte, 12% dijo estar muy insatisfecho y/o insatisfecho y 6% mencionó que no ha utilizado este servicio. (Gráfica 8)

ENMP-IMSS. Gráfica 8. Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas encuestadas con la atención recibida en el servicio de PREVENIMSS, nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

8.2 Conocimiento del servicio de PREVENIMSS

A nivel nacional, el 23% de las personas encuestadas dijo desconocer el servicio de PREVENIMSS. (Gráfica 9)

ENMP-IMSS. Gráfica 9. Distribución porcentual del conocimiento del servicio de PREVENIMSS, nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

8.3 Uso del servicio de PREVENIMSS y calificación del proceso para la atención

El porcentaje de personas encuestadas que solicitaron atención en el servicio de PREVENIMSS en los últimos 6 meses se ubicó en 46% a nivel nacional. (Gráfica 10)

ENMP-IMSS. Gráfica 10. Distribución porcentual de las personas encuestadas que solicitaron atención en el servicio de PREVENIMSS en los últimos seis meses, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Los resultados por sexo muestran que casi la mitad de las mujeres encuestadas solicitaron atención en PREVENIMSS en los últimos seis meses (49%), nueve puntos porcentuales más que los hombres. (Cuadro 10)


ENMP-IMSS. Cuadro 10. Distribución porcentual de las personas encuestadas que solicitaron atención en el servicio de PREVENIMSS en los últimos seis meses por sexo^{1/2}

Sexo	Sí	No
Hombre	40%	59%
Mujer	49%	50%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En cuanto al tiempo de espera desde que las personas llegaron al servicio de PREVENIMSS hasta que recibieron atención con la enfermera, 59% dijo haber esperado menos de 30 minutos, en tanto que 13% esperó una hora o más. (Gráfica 11)


ENMP-IMSS. Gráfica 11. Distribución porcentual del tiempo de espera desde la llegada de la persona encuestada al servicio de PREVENIMSS hasta que recibió atención con la enfermera(o), nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Con respecto a la calificación del proceso para ser atendido en PREVENIMSS, 71% opinó que es excelente o bueno, en tanto que 21% dijo que es regular y 9% lo calificó como malo o pésimo. (Gráfica 12)

ENMP-IMSS. Gráfica 12. Distribución porcentual de la calificación del proceso para ser atendido en el servicio de PREVENIMSS, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

A nivel nacional, al menos al 63% de las personas encuestadas les han realizado las acciones de toma de glucosa en sangre, toma de presión arterial (82%) y toma de peso y talla (83%), en su última visita al servicio de PREVENIMSS; sin embargo, la medición de colesterol y la información sobre nutrición se realiza en menos del 50%. Por su parte, el Papanicolaou y la exploración de mama son acciones que fueron realizadas en el 55% de las mujeres. (Cuadro 11)

ENMP-IMSS. Cuadro 11. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue realizada alguna acción en su última visita al servicio de PREVENIMSS, nacional^{1/2}


Acción	Sí	No
Vacunación	44%	48%
Toma de glucosa en sangre	63%	34%
Toma de presión arterial	82%	16%
Toma de peso y talla	83%	15%
Medición de colesterol	30%	66%
Información sobre nutrición	46%	51%
Salud sexual y reproductiva	47%	49%
Papanicolaou	55%	41%
Exploración de mama	55%	43%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

8.4 Opinión de las personas encuestadas sobre la efectividad del servicio de PREVENIMSS

De las personas encuestadas que calificaron la efectividad del servicio de PREVENIMSS, el 61% la calificó como muy efectivo y/o efectivo en cuanto a la detección temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad; en tanto que el 47% calificó de la misma manera a la efectividad del servicio en la orientación para una buena nutrición. (Gráfica 13)


ENMP-IMSS. Gráfica 13. Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas sobre la efectividad de PREVENIMSS Nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

9. PERCEPCIÓN SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA SALUD DE LOS DH Y HABITANTES DEL PAÍS


ENMP-IMSS. Mapa 6. Peso promedio por OOAD



9.1 Peso y talla

Del total de personas que respondieron, 48% de ellas dijeron tener un peso actual que oscila de 61 a 80 kilos, en tanto que un 7% reconoce un peso de 101 kilos o más. (Gráfica 14)


ENMP-IMSS. Gráfica 14. Distribución porcentual del peso actual de las personas encuestadas, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

El 57% de las y los encuestados dijeron que tienen una talla de 156 a 170 cm. (Gráfica 15)

ENMP-IMSS. Gráfica 15. Distribución porcentual de la talla actual de las personas encuestadas, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

9.2 Actividad física

En la Encuesta Nacional sobre Medicina Preventiva IMSS 2021, se preguntó a los entrevistados sobre la cantidad de tiempo que destinaban cada semana a alguna actividad física. En el cuestionario, esta sección se dividió en dos tipos de actividad física: moderada y vigorosa. La distinción entre ambos tipos fue dejado al criterio del entrevistado. Los resultados de la encuesta también arrojaron que el 33% de los entrevistados realizaban actividades físicas tanto vigorosas como moderadas durante la semana.

En cuanto a la actividad física, 18% mencionó que en la última semana realizó actividad física moderada entre 5 a 7 días. En contraparte, 29% dijo que no realizó ninguna actividad física de este tipo. (Gráfica 16)


ENMP-IMSS. Gráfica 16. Distribución porcentual del número de días que las personas encuestadas realizaron alguna actividad física moderada en la última semana, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

De las personas encuestadas que hicieron actividad física moderada al menos un día en la última semana, 48% la realizó durante más de 60 minutos, en tanto que 25% realizó este tipo de actividad durante 45 minutos o menos. (Gráfica 17)


ENMP-IMSS. Gráfica 17. Distribución porcentual del tiempo que le tomó a las personas encuestadas realizar alguna actividad física moderada en la última semana, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En cuanto a la realización de actividad física vigorosa durante la última semana, solo 16% hizo este tipo de actividad al menos un día. 55% comenta que no realizó ningún tipo de esta actividad en la última semana. (Gráfica 18)


ENMP-IMSS. Gráfica 18. Distribución porcentual del número de días que las personas encuestadas realizaron alguna actividad física vigorosa en la última semana, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

De las personas que realizaron actividad física vigorosa al menos un día en la última semana, 23% dijo que la realizó menos de 45 minutos. 48% considera que la efectúa más de 60 minutos. (Gráfica 19)

ENMP-IMSS. Gráfica 19. Distribución porcentual del tiempo que le tomó a las personas encuestadas realizar alguna actividad física vigorosa en la última semana, nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención. No incluye traslados

Excluyendo los datos extremos, las personas encuestadas de las OOAD´s de Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Durango, Sonora, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, Colima y Veracruz Sur, presentan un índice de masa corporal promedio mayor de 30. (La OMS define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25, y la obesidad como un IMC igual o superior a 30). (Ver anexo, Cuadro 44)

A nivel nacional, 12% de las personas encuestadas dijeron que actualmente fuman. (Gráfica 21). (Una cita del INER Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias señala que 15.9 % de la población mexicana consume tabaco).

ENMP-IMSS. Gráfica 21. Distribución porcentual de las personas encuestadas que actualmente fuman, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

El porcentaje de hombres encuestados que dijeron fumar actualmente se ubicó seis puntos porcentuales por arriba de lo registrado por las mujeres, con 16%. (Cuadro 12).

ENMP-IMSS. Cuadro 12. Distribución porcentual de las personas encuestadas que actualmente fuman por sexo^{1/2/3}


Sexo	Sí	No
Hombre	16%	84%
Mujer	10%	89%

1. El porcentaje de no respuesta en ambos sexos fue menor al 1%
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

9.3. Realización de acciones de detección y preventivas de salud por parte de las personas usuarias

A nivel nacional, con 20% de las menciones se refieren a la diabetes como el principal padecimiento que las personas encuestadas perciben que afecta a una gran parte de la población del país, seguida de la obesidad y la presión arterial alta con 19% y 17%, respectivamente. (Gráfica 22)

ENMP-IMSS. Gráfica 22. Principales padecimientos mencionados por los encuestados que perciben que afectan a una gran parte de la población del país (sin considerar Covid-19)¹



1. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

9.4 Diabetes, hipertensión y obesidad

A nivel nacional, al 52% de las personas encuestadas, algún médico(a) les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad; en contra parte, solo al 21% le han dicho que tienen diabetes. (Cuadro 13)

ENMP-IMSS. Cuadro 13. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen un posible diagnóstico diabetes, hipertensión u obesidad^{1/2/3}

Padecimiento	Sí	No
Diabetes o azúcar en la sangre	21%	78%
Presión alta o hipertensión	31%	68%
Sobrepeso u obesidad	52%	47%

1. El porcentaje de no respuesta para los 3 padecimientos fue menor al 2%.

2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En cuanto a la distribución por sexo, 40% de los hombres encuestados mencionaron que algún médico les dio un posible diagnóstico de hipertensión, y 27% de diabetes o azúcar en la sangre, catorce y ocho puntos porcentuales, más que las mujeres, respectivamente; en tanto que el posible diagnóstico de sobrepeso u obesidad es muy cercano al 50% en ambos sexos. (Cuadro 14).

ENMP-IMSS. Cuadro 14. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) sí les ha dicho que tienen un posible diagnóstico diabetes, hipertensión u obesidad por sexo, nacional.^{1/2}

Sexo	Diabetes o azúcar en la sangre	Presión alta o hipertensión	Sobrepeso u obesidad
Hombre	27%	40%	51%
Mujer	19%	26%	53%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Del total de las personas encuestadas, al menos el 56% se han realizado una detección de diabetes, 61% de hipertensión y 60% colesterol o triglicéridos. (Cuadro 15).

ENMP-IMSS. Cuadro 15. Distribución porcentual de las personas encuestadas que se han realizado una detección diagnóstico diabetes, hipertensión u obesidad, nacional^{1/2/3}


Tipo de detección	Sí	No
Diabetes	56%	43%
Hipertensión	61%	38%
Colesterol o triglicéridos	60%	39%

1. El porcentaje de no respuesta en los 3 tipos de detección fue menor al 1%.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

9.5 Percepción de la silueta corporal

A nivel nacional, el 70% de las mujeres usuarias dijeron identificar su silueta corporal con las figuras “de complejión media” (4, 5 o 6), solo 12% se ubicó en las siluetas relacionadas con obesidad. (Gráfica 23)

ENMP-IMSS. Gráfica 23. Distribución porcentual de la silueta corporal que la persona encuestada percibe que se le parece en este momento, mujeres^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Por grupos de edad, alrededor del 70% de las mujeres encuestadas de 35 a 64 años se ubicaron en las siluetas 4, 5 o 6, en tanto que 3% de las mujeres de 65 años o más se identificaron con la figura 1, y 15% de las mujeres de 35 a 44 años identificaron su silueta con los extremos 7, 8 o 9. (Cuadro 16)

ENMP-IMSS. Cuadro 16. Distribución porcentual de la silueta corporal que la persona encuestada percibe que se le parece en este momento. Mujeres por rango de edad^{1/2/3}

Edad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18-25	1%	10%	17%	29%	24%	12%	5%	1%	0%
26-34	1%	6%	12%	25%	26%	18%	9%	2%	1%
35-44	0%	4%	8%	23%	28%	21%	11%	3%	1%
45-54	1%	3%	9%	23%	27%	21%	10%	3%	1%
55-64	1%	5%	11%	21%	28%	21%	10%	2%	0%
65 y más	3%	6%	10%	20%	26%	21%	9%	3%	1%

1. El porcentaje de no respuesta en la silueta corporal en cada rango de edad fue menor al 2%.

2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Al 63% de las mujeres encuestadas que se identificaron con la silueta media (5), algún médico les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad. En tanto que al menos al 5% de las mujeres que se identificaron con las siluetas 7, 8 o 9, mencionaron que ningún médico les ha dicho que tienen esta condición. (Cuadro 17)

ENMP-IMSS. Cuadro 17. Distribución porcentual de las usuarias a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad por silueta corporal^{1/2/3/4}

Silueta corporal	Sí	No
1	2%	97%
2	3%	97%
3	8%	92%
4	32%	67%
5	63%	35%
6	81%	18%
7	91%	8%
8	95%	5%
9	95%	5%

1. El porcentaje de no respuesta en el diagnóstico de sobrepeso u obesidad para cada una de las siluetas corporales fue menor al 2%.



2. No se muestran los resultados para las personas que no indicaron su tipo de silueta

3. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

4. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

A nivel nacional, 50% de los hombres encuestados perciben su silueta corporal como las ubicadas en la posición 5 o 6, en tanto que 28% se identifica con las siluetas 3 o 4. (Gráfica 24)

ENMP-IMSS. Gráfica 24. Distribución porcentual de la silueta corporal que la persona encuestada (hombres) percibe que se le parece en este momento ^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Alrededor del 55% de los hombres encuestados, de entre 35 y 64 años, algún médico les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad. (Cuadro 18)

ENMP-IMSS. Cuadro 18. Distribución porcentual de los usuarios hombres, a los que algún médico(a) les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad por rango de edad ^{1/2/3}

Edad	Sí	No
18-25	30%	69%
26-34	48%	51%
35-44	57%	42%
45-54	60%	40%
55-64	55%	44%
65 y más	41%	59%

1. El porcentaje de no respuesta en la silueta corporal en cada rango de edad fue menor al 2%.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.


De los hombres que se relacionan con la figura 6, al 75% le han comentado que tienen sobrepeso u obesidad y a más del 90% de los que se relacionan con las siluetas 7, 8 y 9. (Cuadro 19 y Gráfica 25)

ENMP-IMSS. Cuadro 19. Distribución porcentual de los usuarios hombres a los que algún médico(a) les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad por silueta corporal^{1/2/3/4}

Silueta corporal	Sí	No
1	2%	97%
2	4%	96%
3	12%	88%
4	26%	74%
5	50%	49%
6	75%	23%
7	90%	9%
8	97%	3%
9	95%	5%

1. El porcentaje de no respuesta en el diagnóstico de sobrepeso u obesidad para cada una de las siluetas corporales fue menor al 2%.
2. No se muestran los resultados para las personas que no indicaron su tipo de silueta
3. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
4. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS. Gráfica 25. Comparativo por sexo de la distribución porcentual de la silueta corporal que la persona encuestada percibe que se le parece en este momento^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

9.6 Acciones para el control del peso.

Dentro de las acciones que las personas encuestadas están tomando para controlar su peso, ya que algún médico les dijo que tienen sobrepeso u obesidad, destacan: tomar mucha agua, el aumento del consumo de vegetales y alimentos ricos en fibra y la eliminación de comida chatarra, con al menos el 85%. Por otra parte, solo el 26% mencionó que acudió a PREVENIMSS o a medicina preventiva de su unidad para vigilar su peso y 42% sigue las recomendaciones de un profesional de la salud privado. (Gráfica 26)


ENMP-IMSS. Gráfica 26. Distribución porcentual de las acciones que las personas encuestadas están tomando para controlar su peso, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

10. OTROS FACTORES DE SALUD


ENMP-IMSS. Mapa 7. Dificultad para caminar, moverse, subir o bajar escaleras por OOAD.



10.1 Cáncer

Al 6% de las personas encuestadas algún médico les ha dicho que tienen o tuvieron cáncer o un tumor maligno de algún tipo. (Gráfica 27)


ENMP-IMSS. Gráfica 27. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen o tuvieron cáncer o un tumor maligno de cualquier tipo, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.


De las personas encuestadas que tienen o tuvieron cáncer o un tumor maligno de algún tipo, 22% mencionó que es o fue cáncer de mama y el 16% cáncer de cérvix o cuello uterino, siendo estos los dos tipos de cáncer más mencionados a nivel nacional. (Gráfica 28)

ENMP-IMSS. Gráfica 28. Distribución porcentual del tipo de cáncer que tienen o tuvieron las personas encuestadas, nacional^{1/2/3}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta fue de 7%.

ENMP-IMSS. Gráfica 29. Distribución porcentual del tipo de cáncer que tienen o tuvieron las personas encuestadas, por sexo^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional es de 7%.

10.2 Dificultad de algún movimiento

A nivel nacional, 19% de las y los encuestados dijeron que tienen dificultad para caminar, moverse, subir o bajar escaleras de manera permanente. (Gráfica 29)

ENMP-IMSS. Gráfica 29. Distribución porcentual de las personas encuestadas que permanentemente tienen dificultad para caminar, moverse, subir o bajar escaleras, nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En el desglose por sexo, el porcentaje de personas con dificultad permanente para caminar, moverse, subir o bajar escaleras es muy similar entre hombres 18% y mujeres 19%.


11. ENFERMEDADES CRÓNICAS DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR

ENMP-IMSS. Mapa 8. Distribución de la presencia de enfermedades crónicas en miembros del hogar del encuestado, por OOAD.



Al menos el 50% de los encuestados dijo que algún miembro de su hogar ha sido diagnosticado con diabetes, hipertensión, sobrepeso u obesidad. (Gráfica 31)


ENMP-IMSS. Gráfica 31. Distribución porcentual de los miembros del hogar diagnosticados con algún padecimiento crónico, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

De estas personas encuestadas que afirmaron que algún miembro de su hogar ha sido diagnosticado con sobrepeso u obesidad, solo 56% mencionó que dichos miembros están llevando acciones para controlar su peso. (Gráfica 32)

ENMP-IMSS. Gráfica 32. Distribución porcentual de los miembros del hogar con diagnóstico de obesidad que están llevando acciones para controlar su peso, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

A nivel nacional, el 23% de las personas encuestadas indicó que la mala alimentación o los hábitos alimenticios inapropiados, así como el consumo de comida chatarra con un 10% son dos de los factores principales que más influyen para que México tenga un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso. (Gráfica 33)

ENMP-IMSS. Gráfica 33. Distribución del total de menciones sobre los factores que las personas encuestadas perciben que más influyen en que en México se tenga un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso Nacional^{1/2/3}



1. Respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100%.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. 77% de los usuarios mencionaron algunos de los factores

Por sexo, 23 % de las mujeres indicó también que la mala alimentación o los hábitos alimenticios inapropiados, es uno de los factores que más influye a que nuestro país exista un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso. (Cuadro 20).

ENMP-IMSS Cuadro 20. Distribución porcentual de los factores que las personas encuestadas perciben que más influyen en que en México se tenga un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso por sexo^{1/2}

Factor	Nacional	Hombre	Mujeres
Mala alimentación/Hábitos alimenticios inapropiados	23%	22%	23%
Consumo de comida chatarra/rápida/procesada	10%	11%	9%
No realizar actividad física/ejercicio/deporte	9%	9%	10%
Falta de educación/información/cultura/conciencia para la salud	7%	8%	6%
Sedentarismo	7%	6%	7%
El costo elevado de los alimentos/dieta	4%	4%	5%
Estrés/Ansiedad/Depresión/Salud mental	4%	3%	4%
Por genética/herencia	2%	2%	3%
Estilo de vida (horarios laborales, tiempos de traslado, fumar y/o beber, confinamiento Covid-19)	2%	2%	2%
Falta de interés y autocuidado	2%	2%	2%
Sin seguimiento, revisión u orientación médica/nutricional	2%	2%	2%
Falta de tiempo para preparar alimentos y/o para hacer ejercicio	1%	1%	1%
Obesidad/Sobrepeso	1%	1%	1%
Falta de programas promocionales y espacios adecuados para hacer ejercicio	1%	1%	0%
Otro	3%	3%	2%

1. El porcentaje de no respuesta para cada sexo se sitúa en el intervalo 23% - 25%.

2. Respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100%.

3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Por edad, al menos 20% de las personas encuestadas de los distintos rangos de edad, también coinciden que la mala alimentación o los hábitos alimenticios inapropiados, es uno de los factores principales que más influyen en tener un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso. (Cuadro 21)


ENMP-IMSS Cuadro 21. Distribución porcentual de los factores que las personas encuestadas perciben que más influyen en que en México se tenga un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso por grupo de edad^{1/2}

Factor	Total	18-25	26-34	35-44	45-54	55-64	65 y más
Mala alimentación/Hábitos alimenticios inapropiados	23%	20%	21%	23%	24%	24%	24%
Consumo de comida chatarra/rápida/procesada	10%	9%	8%	9%	10%	12%	12%
No realizar actividad física/ejercicio/deporte	9%	9%	9%	10%	10%	9%	10%
Falta de educación/información/cultura/conciencia para la salud	7%	9%	8%	6%	6%	7%	6%
Sedentarismo	7%	4%	6%	7%	8%	8%	6%
El costo elevado de los alimentos/dieta	4%	4%	4%	5%	4%	4%	3%
Estrés/Ansiedad/Depresión/Salud mental	4%	3%	4%	4%	5%	3%	3%
Por genética/herencia	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%
Estilo de vida (horarios laborales, tiempos de traslado, fumar y/o beber, confinamiento Covid-19)	2%	2%	3%	3%	2%	2%	2%
Falta de interés y autocuidado	2%	3%	2%	2%	1%	2%	1%
Sin seguimiento, revisión u orientación médica/nutricional	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Falta de tiempo para preparar alimentos y/o para hacer ejercicio	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%
Obesidad/Sobrepeso	1%	0%	1%	1%	1%	1%	1%
Falta de programas promocionales y espacios adecuados para hacer ejercicio	1%	1%	1%	1%	1%	1%	0%
Otro	3%	3%	3%	2%	3%	2%	3%

1. Alrededor del 80% de los entrevistados hicieron sugerencias
2. Respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100%.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

12. PERCEPCIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN DEL COVID Y ACCIONES PREVENTIVAS


ENMP-IMSS. Mapa 9. Distribución porcentual de la vacunación contra Covid-19 de las personas encuestadas por OOAD



12.1 Diagnóstico por Covid-19 de las personas encuestadas o de algún miembro de su vivienda

En cuanto al Covid-19, el 16% (Gráfica 34) de las personas encuestadas dijo que ella o algún miembro de su familia tuvieron un diagnóstico positivo de junio a septiembre de este año.

ENMP-IMSS. Gráfica 34. Distribución porcentual del diagnóstico por Covid-19 de las personas encuestadas o de algún miembro de su vivienda, de junio a septiembre 2021, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En el desglose por sexo, no se observa una diferencia importante en el porcentaje de personas diagnosticadas con Covid-19 en la vivienda. (Cuadro 22)

ENMP-IMSS. Cuadro 22. Distribución porcentual de la persona diagnosticada con Covid-19 en la vivienda por sexo^{1/2/3}

Sexo	Usted	Otra persona
Hombre	48%	50%
Mujer	45%	54%

1. La no respuesta en la persona diagnosticada con Covid-19 fue de 2% en cada sexo.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

Los Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, donde se presentaron más casos de personas encuestadas que mencionaron haber sido diagnosticadas con Covid-19, son Baja California y Querétaro con 57%. (Ver anexo, Cuadro A23)

En el último mes, 44% de las personas encuestadas se han sentido nerviosas o estresadas muy a menudo y/o a menudo, en tanto que el 34% dijo haberse sentido así de vez en cuando. (Gráfica 35)

ENMP-IMSS. Gráfica 35. Distribución porcentual de la frecuencia con que las personas encuestadas se han sentido nerviosas o estresadas en el último mes, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

El 51% de las mujeres encuestadas mencionaron que en el último mes se sintieron nerviosas o estresadas muy a menudo o a menudo, diecinueve puntos porcentuales más que los hombres. (Cuadro 21)


ENMP-IMSS. Cuadro 21. Distribución porcentual de la frecuencia con que las personas encuestadas se han sentido nerviosas o estresadas en el último mes por sexo^{1/2/3}

Sexo	Muy a menudo	A menudo	De vez en cuando	Casi nunca	Nunca
Hombre	14%	18%	36%	21%	11%
Mujer	27%	24%	33%	11%	5%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta fue menor a 1%.

Por otra parte, a nivel nacional, 50% de las y los encuestados dijeron que subieron de peso durante el confinamiento por la contingencia sanitaria por Covid-19. (Gráfica 20)

ENMP-IMSS. Gráfica 36. Distribución porcentual del cambio de peso en las personas encuestadas durante el confinamiento por la contingencia sanitaria por Covid-19, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En el desglose por sexo, 53% de las mujeres encuestadas manifestaron que subieron de peso, diez puntos porcentuales más que los hombres. (Cuadro 22)

ENMP-IMSS. Cuadro 22. Distribución porcentual del cambio de peso en las personas encuestadas durante el confinamiento por la contingencia sanitaria por Covid-19 por sexo^{1/2}


Sexo	Sí, subí de peso	Sí, bajé de peso	No, me mantuve en mí mismo peso
Hombre	43%	18%	37%
Mujer	53%	16%	28%

1. El porcentaje de no respuesta en ambos sexos fue menor al 3%.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

12.2 Vacunación contra Covid-19 de las personas usuarias

El 68% de las y los encuestados (Gráfica 37) dijo tener el esquema completo de vacunación contra Covid-19, 58% recibió las dos dosis de la vacuna y 10% recibió la vacuna de una sola dosis.

ENMP-IMSS. Gráfica 37. Distribución porcentual de la vacunación contra Covid-19 de las personas encuestadas, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En el desglose por sexo, se observa que 73% de los hombres encuestados cuentan con el esquema de vacunación contra Covid-19 completo, siete puntos porcentuales más que las mujeres (66%). (Cuadro 27)


ENMP-IMSS. Cuadro 27. Distribución porcentual de la vacunación contra Covid-19 de las personas encuestadas por sexo^{1/2/3}

Sexo	Ha recibido la vacuna de una sola dosis	Ha recibido la primera dosis de las dos necesarias	Ha recibido las dos dosis
Hombre	9%	19%	64%
Mujer	11%	24%	55%

1. El porcentaje de no respuesta para ambos sexos fue menor al 10%.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

A nivel nacional, 72% de las personas encuestadas recibieron al menos una dosis de las vacunas contra Covid-19 de los laboratorios Pfizer o AstraZeneca. (Gráfica 38)

ENMP-IMSS. Gráfica 38. Distribución porcentual del tipo de vacuna recibida contra Covid-19, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

El porcentaje de personas encuestadas que recibieron las vacunas Pfizer o AstraZeneca no presentan diferencias importantes entre hombres y mujeres, ubicándose entre el 35% y 38%. (Cuadro 28)


ENMP-IMSS. Cuadro 28. Distribución porcentual del tipo de vacuna recibida contra Covid-19 por sexo^{1/2}

Sexo	Pfizer	Astra Zeneca	Sinovac	Cansino	Sputnik V	Moderna	Johnson & Johnson
Hombre	37%	36%	12%	5%	7%	2%	1%
Mujer	35%	38%	10%	7%	6%	2%	1%

1. El porcentaje de la respuesta "No sé" para ambos sexos fue menor del 1%.
2. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
3. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

En el significado de estar vacunado para las personas encuestadas se observa de la manera siguiente: 71% se siente más seguro(a) para trabajar fuera de su casa y en caso de que se contagie el efecto será menor y no requerirá hospitalización. Para el 42% significa que siguen en riesgo de contagio y el 44% indicó que vacunarse no tiene ningún efecto. (Gráfica 39)

ENMP-IMSS. Gráfica 39. Distribución porcentual de lo que significa para las personas encuestadas el estar vacunado contra Covid-19, nacional^{1/2}




1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

12.2 Acciones preventivas Covid-19

En el último mes, al menos el 92% de las personas encuestadas han aplicado en su hogar o rutina diaria el lavado de manos, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y el uso de gel, como medidas preventivas contra el Covid-19; sin embargo, el no recibir visitas y la realización de pruebas de detección se realiza en menos del 73%. (Gráfica 40)

ENMP-IMSS. Gráfica 40. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19, nacional^{1/2}



1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

13. ALGUNAS CONCLUSIONES

La Encuesta Nacional sobre Medicina Preventiva IMSS 2021 (ENMP-IMSS), como se comentó anteriormente, se aplicó en línea, en la segunda quincena de septiembre del año 2021, con el envío del cuestionario a poco más de 500 mil correos de usuarios que asistieron a recibir una atención para su salud, en una unidad médica del IMSS entre los meses de mayo a septiembre y tenía entre sus objetivos:

- Conocer el grado de satisfacción de los usuarios con los servicios que reciben en las Unidades Médicas del IMSS.
- Integrar las opiniones de los usuarios sobre el servicio de PREVENIMSS.
- Identificar las acciones que llevan a cabo los usuarios para el cuidado de su salud, así como de detección de enfermedades crónicas.
- Conocer la opinión de los usuarios sobre la vacunación contra el Covid-19, así como las acciones que llevan a cabo para evitar el contagio.
- Medir la opinión sobre los logros y problemáticas del Instituto.

Un estudio de esta naturaleza tiene algunas limitaciones metodológicas para aplicar algunas estimaciones, no obstante, con la respuesta alcanzada y el análisis de sus resultados permite señalar algunas evidencias sobre el desempeño del IMSS y de sus programas institucionales:

La participación de 25 mil DH denota el interés significativo de opinar y de manifestar de alguna manera una **preocupación por las cuestiones de salud, que son consideradas prioritarias para el bienestar de la población DH; en su gran mayoría son mujeres** que proporcionan su opinión. Los principales motivos de salud por los cuales asiste el derechohabiente a las clínicas del IMSS son controles de hipertensión (13%) y diabetes (9%). Otro tipo de atención médica solicitada se refiere a las acciones preventivas (13%), problemas respiratorios (3%) y motivos relacionados por COVID.

La opinión respecto **a la presencia institucional se mantiene prácticamente en los niveles de la encuesta anterior** que se aplicó en mayo 2021. Esto es el grado de satisfacción en su última visita es de alrededor **del 60% (muy satisfecho/satisfecho)**, además de que es una institución donde **el trato es igualitario tanto para hombres como las mujeres (80%)** y una **quinta parte de estos entrevistados la considera que el servicio es mejor** que el de otras instituciones públicas de atención a la salud del país. A destacar de manera positiva, es la opinión de los usuarios (69%) **que están de acuerdo que el IMSS amplíe su cobertura a otras poblaciones independientemente si son asegurados.** 11 % identifica el

nombre de nuestro director general como el responsable de la conducción de esta institución.

Entre los principales logros del IMSS, se señalan: el de brindar atención médica, garantizar derecho y acceso a la salud y el buen desempeño durante la pandemia. Por otra parte, poco más de una tercera parte de los encuestados perciben la **mala atención médica o mal trato** como el principal problema del IMSS para proporcionar servicios de salud de calidad y así cumplir con las expectativas de las personas usuarias. En segundo lugar, está la **falta de medicamentos**, medicamentos de baja calidad o falta de vacunas (17%).

Respecto al PREVENIMSS la valoración sobre este programa se observa muy satisfactoria, en cuanto a **conocimiento** (75%), su **utilización en los últimos 6 meses** (46%) y **el tiempo de espera** para recibir una atención (59% espero menos de 30 minutos).

El usuario además **percibe una alta frecuencia y recordamiento de las acciones preventivas** que le aplicaron en cuanto a la **toma de presión arterial** (82%) y de **peso y talla** (83%). En el caso específico de las mujeres **más del 50% recuerda la prueba de Papanicolaou y a la exploración de Mama**.

Como resultado de este recordamiento el **grado de satisfacción** de PREVENIMSS sobre la atención es de **59% (satisfecho/muy satisfecho)** y el proceso de ser atendido es del 71% en las **categorías de excelente y/bueno**. Respecto **a la efectividad del programa** más de la mitad lo considera como muy efectivo y/o efectivo, aunque una de las acciones menos valorada hacia una de sus acciones se refiere a la orientación sobre la de tener una buena nutrición (**53 % lo considera regular o poco efectiva esta orientación**).

En adición a la opinión del este programa, también se consideró conveniente, **estudiar como los DH se perciben en cuanto a su peso, talla, su figura corpórea y que tipo de acciones toman para estar al tanto de su salud**. Los DH reconocen (más del 50%) que se hacen una detección para determinar azúcar en la sangre, control de hipertensión colesterol y triglicéridos (alrededor del 60%), y **más de la mitad reconoce que algún médico** le ha comentado que tiene **sobrepeso**.

Es de más señalarlo, pero la obesidad es ya uno de los problemas de salud de este país, que combinado con la diabetes se convierte en otra dimensión sanitaria que implica muchos recursos para su prevención y control.

El promedio de peso registrado fue de 83 kg para hombres y 71 kg para mujeres, la estatura promedio es de 1.69m hombres y 1.57m mujeres (indicadores semejantes a los de otros estudios realizados), prácticamente la mitad de los usuarios percibe que subió de peso durante la pandemia. **Si a esta información la observamos con un indicador de masa corporal IMC**

(el estado de su peso con respecto a la estatura), a nivel nacional es de 29.20, y con las restricciones metodológicas que puede contener esta encuesta, se puede observar que en 16 OOAD's (Baja California, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Yucatán, Campeche, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Durango, Sonora, Chiapas, Quintana Roo, Michoacán, Colima y Veracruz Sur) se encuentran en obesidad grado 1 y el resto está en sobrepeso. (IMC= 30 y superior obesidad grado I, 25.0 a 29.9 sobrepeso).

Entre las acciones que aplican para reducir el peso: **una proporción alta (80%) dice tomar mucha agua, que aumenta el consumo de vegetales, elimina comida chatarra, suprime el consumo de refrescos, disminuye las porciones** y alrededor del 60% incrementa la actividad física o practica algún deporte. Pero al preguntar sobre **la frecuencia para la actividad física** que realizaron en la última semana, los números son poco alentadores alrededor del 30% no realizó ninguna actividad física, y los que la realizan, un gran porcentaje lo hace un día a la semana y por pocos minutos.

Manifiestan que los factores que han influido en el sobrepeso son entre otros la mala alimentación (23%), consumo de comida chatarra/rápida y no realizar la actividad física o deporte alrededor del 10% de las menciones. Otros factores que se señalan con menor proporción, es **falta de educación e información y conciencia sobre el cuidado de la salud**, sedentarismo, el costo elevado en los alimentos, y **problemas de estrés o depresión**.

Al solicitar a las personas encuestadas que identifiquen cuales son los principales padecimientos que perciben afecta a una gran parte de la población del país (sin considerar Covid-19) estos señalan **diabetes, hipertensión, obesidad, desnutrición, salud mental y cáncer**. Y esto queda evidenciado con la percepción de los DH sobre de las enfermedades crónicas de los miembros del hogar. Los números de la encuesta señalan que más de la mitad padecen diabetes, hipertensión y sobrepeso u obesidad.

Por otra parte, 6% de las personas encuestadas señalan que con un diagnóstico médico tienen o tuvieron cáncer o un tumor maligno de algún tipo, entre los cánceres que citan con mayor frecuencia son 22% mama, 16% cuello uterino, 8% próstata, 7% tiroides, 7% ovario y 6% piel.

Respecto a la situación del COVID-19, entre junio a septiembre 2021, 16% de las personas que respondieron al estudio, manifestaron que el usuario o algún miembro de su vivienda tuvieron un diagnóstico positivo de Covid-19. De estos el 46% reconoce que fue el propio usuario y el 53% otra persona de la vivienda.

Muy positiva han sido la difusión de las medidas preventivas que se han difundido y que se han aplicado en el hogar en el último mes para el COVID-19, **han tenido una gran respuesta cercana al 100%** por parte de la

población DH en **uso de cubrebocas, lavado de manos por lo menos 20 segundos, uso de gel, vacunación contra COVID-19** en mayores de 50 años. Sin embargo, el acto de no recibir visitas (72%) en el hogar no se aceptó con tanta frecuencia y solo poco más de la mitad se aplicó pruebas para detección de COVID-19.

Los avances en materia de vacunación se evidencian positivamente con la opinión de los usuarios. Si pensamos que estas son las cifras hasta el mes de septiembre 2021, **se tiene un logro de poco más del 80% de los usuarios que han recibido las dos (60%) o una sola (22%) y un 10% la vacuna de una sola dosis.** Las vacunas que manifiestan les han aplicado en su mayoría son AstraZeneca y Pfizer (suma de ambas 72%).

Sobre los significados de vacunarse, las opiniones de los usuarios son: 32% considera que no se va a contagiar, 71% se siente más seguro para trabajar fuera de su casa, 71% en caso de que se contagie el efecto será menor y no requerirá hospitalización, aunque alrededor de 44% piensa que vacunarse no tiene ningún efecto (en la encuesta anterior la opinión del usuario sobre sobre la expectativas que tienen sobre la vacunación fue una alta expectativa, casi el 70% piensa que con la vacunación se van a sentir muy protegidos).

Con estos resultados se puede señalar que se percibe una gran aceptación y presencia nacional del IMSS como una institución muy importante en la transformación de los servicios de salud , el hecho de que los DH externen una opinión muy positiva hacia la probable ampliación de los servicios institucionales, habla también de una imagen positiva que guardan en su percepción y esto da la pauta hacia una población que reconoce el trabajo institucional y que ve muy positivo que otras personas accedan independientemente de que puedan cubrir una cuota por el acceso a estos servicios de salud.

Las opiniones sobre el PREVENIMSS son muy satisfactorias y sería conveniente estudiar con mayor detalle algunos de los resultados y con ello apoyar su fortalecimiento con campañas y acciones preventivas en lo que respecta a una difusión de tipo educativo sobre aspectos nutricionales.

La disminución de la obesidad y la diabetes son dos retos que tienen muchos años de trabajo institucional y que no han podido controlarse de una forma muy satisfactoria. La Pandemia, el aislamiento social han sin duda acentuado esta problemática de salud en la población del país.

Las acciones preventivas y de atención de salud para mitigar los efectos de un contagio de COVID, han sido producto de un gran trabajo institucional apoyado por su personal de salud, equipo médico, así como la difusión masiva de mensajes para evitar el contagio, la vacunación, el uso de la información, la atención a través de los MARS, entre otros, son elementos



que señalan a una institución muy robusta y comprometida con la salud de los DH, y así la perciben la mayoría de sus usuarios.

ANEXO: RESULTADOS POR OOAD

Se reitera al lector que los resultados por OOAD, que a continuación se presentan no son estadísticamente representativos, ya que la encuesta realizada no fue de tipo probabilístico. Por esto, se recomienda reserva en la interpretación y comparación de las cifras correspondientes entre los distintos OOAD del Instituto Mexicano del Seguro Social.

ENMP-IMSS Cuadro A1. Tabla Distribución porcentual de algunos de los motivos o problemas de salud por el que las personas acudieron a solicitar atención en su última visita a la unidad médica por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Problemas respiratorios (tos, gripe, temperatura elevada, etc.)	Control de embarazo	Infecciones estomacales	Control de diabetes	Control de hipertensión	Accidentes (golpes, caídas, etc.)	Sospecha COVID o COVID	Trámite de incapacidad por COVID o sospecha de COVID	Trámite de incapacidad por otro padecimiento	Acciones preventivas (toma de presión arterial, glucosa, colesterol, Papanicolaou, exploración de mama, tamiz neonatal)	Otro
Aguascalientes	4%	2%	3%	10%	16%	6%	3%	1%	2%	12%	39%
Baja California	3%	3%	2%	17%	25%	3%	1%	1%	4%	7%	32%
Baja California Sur	9%	6%	3%	3%	9%	3%	8%	8%	3%	11%	38%
Campeche	6%	2%	4%	6%	14%	4%	4%	4%	1%	13%	41%
Chiapas	6%	2%	6%	8%	10%	4%	4%	1%	1%	16%	41%
Chihuahua	2%	3%	3%	11%	14%	6%	1%	1%	4%	13%	40%
Coahuila	3%	4%	3%	8%	11%	6%	2%	1%	4%	11%	44%
Colima	2%	2%	1%	6%	10%	5%	6%	3%	1%	16%	47%
CDMX Norte	4%	1%	4%	7%	10%	4%	4%	1%	2%	13%	47%
CDMX Sur	3%	1%	4%	8%	10%	4%	2%	1%	3%	12%	50%
Durango	3%	4%	2%	13%	17%	4%	3%	1%	2%	12%	34%
México Oriente	4%	2%	5%	8%	8%	5%	4%	1%	3%	13%	44%
México Poniente	4%	2%	4%	7%	9%	7%	4%	1%	5%	14%	41%
Guanajuato	3%	2%	3%	14%	17%	4%	1%	1%	3%	11%	37%
Guerrero	5%	1%	5%	4%	3%	5%	6%	1%	1%	19%	47%
Hidalgo	3%	2%	2%	7%	9%	5%	4%	1%	4%	15%	44%
Jalisco	3%	1%	2%	11%	17%	6%	3%	1%	4%	11%	38%
Michoacán	2%	1%	2%	10%	16%	6%	2%	4%	3%	3%	46%
Morelos	3%	2%	6%	8%	14%	4%	4%	1%	2%	14%	41%
Nayarit	2%	2%	10%	10%	7%	2%	2%	2%	2%	7%	50%
Nuevo León	3%	3%	2%	15%	17%	5%	4%	2%	2%	13%	32%
Oaxaca	4%	1%	7%	5%	6%	4%	5%	1%	1%	19%	43%
Puebla	5%	2%	5%	7%	9%	5%	4%	3%	3%	14%	42%
Querétaro	4%	3%	4%	7%	7%	7%	3%	1%	4%	12%	44%
Quintana Roo	2%	3%	3%	10%	12%	7%	2%	3%	2%	14%	39%
San Luis Potosí	3%	2%	3%	6%	6%	9%	3%	7%	7%	21%	38%
Sinaloa	2%	4%	3%	3%	20%	5%	3%	3%	8%	12%	36%
Sonora	5%	2%	5%	7%	13%	5%	3%	1%	5%	15%	37%
Tabasco	4%	3%	4%	6%	9%	6%	7%	4%	3%	13%	37%
Tamaulipas	4%	3%	2%	10%	12%	6%	5%	3%	3%	10%	38%
Tlaxcala	15%		2%	2%	12%	2%	2%			22%	37%
Veracruz Norte	2%	2%	3%	10%	12%	4%	4%	1%	2%	10%	47%
Veracruz Sur	4%	3%	5%	8%	7%	3%	8%	2%	4%	13%	39%
Yucatán	3%	1%	4%	6%	16%	3%	5%	2%	3%	13%	42%
Zacatecas	6%	3%	4%	8%	11%	6%	4%	1%	3%	12%	38%
Nacional	3%	2%	4%	9%	12%	5%	3%	1%	3%	12%	41%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A2. Tabla Distribución porcentual de las personas que requirieron o no ser acompañados para acudir a consulta por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	18%	82%
Baja California	16%	84%
Baja California Sur	16%	83%
Campeche	19%	80%
Chiapas	21%	78%
Chihuahua	17%	83%
Coahuila	23%	76%
Colima	16%	84%
CDMX Norte	22%	78%
CDMX Sur	24%	75%
Durango	17%	82%
México Oriente	23%	76%
México Poniente	22%	78%
Guanajuato	19%	81%
Guerrero	23%	77%
Hidalgo	21%	79%
Jalisco	18%	82%
Michoacán	13%	86%
Morelos	21%	79%
Nayarit	21%	79%
Nuevo León	20%	80%
Oaxaca	15%	84%
Puebla	22%	78%
Querétaro	21%	79%
Quintana Roo	17%	82%
San Luis Potosí	12%	88%
Sinaloa	18%	82%
Sonora	23%	78%
Tabasco	21%	78%
Tamaulipas	18%	81%
Tlaxcala	22%	78%
Veracruz Norte	23%	77%
Veracruz Sur	23%	77%
Yucatán	19%	81%
Zacatecas	21%	79%
Nacional	20%	79%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A3. Tabla Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas encuestadas con la atención recibida en su última visita a la unidad médica por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Muy satisfecho(a)	Satisfecho(a)	Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)	Insatisfecho(a)	Muy insatisfecho(a)
Aguascalientes	27%	37%	14%	12%	10%
Baja California	29%	41%	11%	10%	8%
Baja California Sur	38%	31%	8%	15%	9%
Campeche	22%	43%	14%	11%	7%
Chiapas	19%	46%	16%	10%	8%
Chihuahua	20%	38%	15%	15%	11%
Coahuila	25%	38%	14%	11%	10%
Colima	32%	35%	16%	11%	3%
CDMX Norte	22%	39%	15%	13%	11%
CDMX Sur	23%	36%	14%	15%	12%
Durango	22%	38%	15%	14%	11%
México Oriente	15%	36%	17%	17%	14%
México Poniente	21%	39%	15%	14%	11%
Guanajuato	22%	42%	14%	12%	9%
Guerrero	29%	35%	17%	10%	10%
Hidalgo	19%	37%	17%	14%	11%
Jalisco	26%	36%	13%	13%	10%
Michoacán	20%	32%	10%	21%	16%
Morelos	25%	43%	13%	11%	7%
Nayarit	26%	36%	14%	12%	10%
Nuevo León	25%	38%	13%	13%	9%
Oaxaca	28%	35%	8%	17%	11%
Puebla	18%	39%	17%	14%	12%
Querétaro	19%	40%	16%	12%	13%
Quintana Roo	22%	37%	16%	15%	9%
San Luis Potosí	25%	35%	18%	12%	8%
Sinaloa	34%	34%	14%	9%	10%
Sonora	29%	35%	15%	11%	9%
Tabasco	22%	36%	11%	15%	16%
Tamaulipas	21%	38%	14%	14%	12%
Tlaxcala	22%	32%	17%	15%	15%
Veracruz Norte	22%	41%	13%	12%	12%
Veracruz Sur	22%	43%	12%	11%	10%
Yucatán	23%	38%	16%	12%	9%
Zacatecas	27%	36%	15%	13%	9%
Nacional	23%	38%	14%	13%	11%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A4. Distribución porcentual del nivel de satisfacción de las personas encuestadas con la atención recibida en el servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Muy satisfecho(a)	Satisfecho(a)	Ni satisfecho(a) ni insatisfecho(a)	Insatisfecho(a)	Muy insatisfecho(a)	No aplica (no lo he utilizado)
Aguascalientes	17%	48%	18%	5%	4%	6%
Baja California	19%	44%	19%	5%	1%	7%
Baja California Sur	25%	37%	26%	7%	2%	4%
Campeche	14%	43%	23%	8%		8%
Chiapas	15%	51%	25%	6%		4%
Chihuahua	15%	43%	20%	7%	4%	8%
Coahuila	18%	44%	21%	6%	3%	7%
Colima	28%	49%	15%	3%	3%	
CDMX Norte	13%	43%	24%	9%	3%	6%
CDMX Sur	14%	41%	22%	8%	4%	8%
Durango	14%	48%	21%	5%	4%	4%
México Oriente	10%	42%	24%	10%	6%	4%
México Poniente	13%	43%	23%	9%	4%	6%
Guanajuato	14%	45%	22%	7%	3%	6%
Guerrero	23%	43%	21%	5%	5%	2%
Hidalgo	13%	42%	26%	8%	4%	4%
Jalisco	16%	41%	22%	9%	4%	6%
Michoacán	12%	42%	31%	8%	4%	3%
Morelos	18%	51%	18%	6%	3%	2%
Nayarit	18%	44%	21%	18%		
Nuevo León	16%	46%	18%	7%	3%	8%
Oaxaca	12%	50%	23%	7%	2%	4%
Puebla	13%	42%	24%	9%	4%	6%
Querétaro	11%	46%	25%	7%	4%	3%
Quintana Roo	12%	39%	28%	8%	4%	8%
San Luis Potosí	18%	43%	22%	8%	3%	3%
Sinaloa	19%	46%	21%	3%	4%	6%
Sonora	21%	47%	19%	5%	2%	5%
Tabasco	22%	44%	18%	6%	2%	4%
Tamaulipas	17%	43%	19%	7%	4%	8%
Tlaxcala	3%	42%	33%	6%	9%	3%
Veracruz Norte	12%	49%	20%	7%	3%	6%
Veracruz Sur	16%	46%	18%	8%	5%	5%
Yucatán	14%	42%	23%	7%	4%	7%
Zacatecas	20%	39%	19%	12%	4%	4%
Nacional	15%	44%	22%	8%	4%	6%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A5. Distribución porcentual del conocimiento del servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	77%	21%
Baja California	75%	22%
Baja California Sur	75%	19%
Campeche	85%	11%
Chiapas	87%	13%
Chihuahua	62%	35%
Coahuila	73%	25%
Colima	86%	13%
CDMX Norte	78%	20%
CDMX Sur	77%	22%
Durango	80%	17%
México Oriente	71%	27%
México Poniente	73%	26%
Guanajuato	74%	24%
Guerrero	88%	11%
Hidalgo	74%	24%
Jalisco	77%	20%
Michoacán	79%	19%
Morelos	93%	7%
Nayarit	85%	10%
Nuevo León	72%	25%
Oaxaca	83%	16%
Puebla	74%	24%
Querétaro	80%	16%
Quintana Roo	76%	22%
San Luis Potosí	89%	9%
Sinaloa	83%	16%
Sonora	78%	19%
Tabasco	74%	24%
Tamaulipas	64%	32%
Tlaxcala	85%	15%
Veracruz Norte	77%	20%
Veracruz Sur	76%	23%
Yucatán	81%	17%
Zacatecas	74%	24%
Nacional	75%	23%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A6. Distribución porcentual de las personas encuestadas que solicitaron atención en el servicio de PREVENIMSS en los últimos seis meses por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	49%	50%
Baja California	45%	55%
Baja California Sur	47%	53%
Campeche	53%	47%
Chiapas	51%	48%
Chihuahua	36%	63%
Coahuila	42%	58%
Colima	53%	46%
CDMX Norte	47%	53%
CDMX Sur	46%	54%
Durango	47%	52%
México Oriente	50%	49%
México Poniente	45%	54%
Guanajuato	44%	56%
Guerrero	51%	49%
Hidalgo	47%	53%
Jalisco	50%	49%
Michoacán	54%	46%
Morelos	57%	41%
Nayarit	51%	49%
Nuevo León	39%	61%
Oaxaca	51%	49%
Puebla	51%	48%
Querétaro	49%	51%
Quintana Roo	41%	58%
San Luis Potosí	62%	37%
Sinaloa	45%	54%
Sonora	42%	57%
Tabasco	49%	51%
Tamaulipas	37%	62%
Tlaxcala	53%	44%
Veracruz Norte	44%	55%
Veracruz Sur	41%	59%
Yucatán	41%	58%
Zacatecas	43%	57%
Nacional	46%	53%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A7. Distribución porcentual del tiempo de espera desde la llegada de la persona encuestada al servicio de PREVENIMSS hasta que recibió atención con la enfermera(o) por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Menos de 30 minutos	De 31 a 60 minutos	Entre una hora y dos horas	Más de 2 horas
Aguascalientes	64%	25%	6%	3%
Baja California	55%	31%	6%	4%
Baja California Sur	48%	26%	11%	15%
Campeche	46%	33%	13%	9%
Chiapas	45%	38%	7%	5%
Chihuahua	52%	28%	10%	7%
Coahuila	54%	28%	7%	6%
Colima	62%	20%	10%	8%
CDMX Norte	67%	23%	7%	3%
CDMX Sur	61%	26%	6%	6%
Durango	67%	24%	6%	3%
México Oriente	58%	23%	10%	7%
México Poniente	55%	31%	8%	5%
Guanajuato	60%	25%	9%	4%
Guerrero	59%	23%	12%	5%
Hidalgo	43%	32%	14%	10%
Jalisco	65%	22%	6%	5%
Michoacán	66%	22%	5%	7%
Morelos	57%	28%	8%	7%
Nayarit	65%	29%	6%	
Nuevo León	66%	23%	7%	2%
Oaxaca	56%	28%	12%	4%
Puebla	57%	27%	9%	6%
Querétaro	47%	29%	14%	10%
Quintana Roo	46%	35%	6%	9%
San Luis Potosí	54%	31%	11%	3%
Sinaloa	66%	22%	11%	2%
Sonora	67%	24%	3%	4%
Tabasco	49%	31%	11%	8%
Tamaulipas	59%	24%	8%	7%
Tlaxcala	33%	44%	11%	11%
Veracruz Norte	52%	29%	9%	7%
Veracruz Sur	64%	23%	4%	9%
Yucatán	61%	29%	5%	4%
Zacatecas	58%	21%	9%	9%
Nacional	59%	26%	8%	5%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A8. Distribución porcentual de la calificación del proceso para ser atendido en el servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Excelente	Bueno	Regular	Malo	Pésimo
Aguascalientes	26%	47%	20%	3%	4%
Baja California	29%	47%	20%	3%	1%
Baja California Sur	26%	37%	30%	4%	4%
Campeche	20%	48%	24%	4%	4%
Chiapas	17%	55%	24%	5%	
Chihuahua	18%	44%	23%	7%	9%
Coahuila	28%	41%	27%	2%	3%
Colima	34%	48%	12%	2%	2%
CDMX Norte	24%	49%	19%	5%	3%
CDMX Sur	26%	45%	21%	5%	3%
Durango	30%	44%	19%	4%	3%
México Oriente	19%	46%	24%	6%	5%
México Poniente	20%	50%	20%	6%	4%
Guanajuato	23%	46%	22%	5%	4%
Guerrero	30%	42%	20%	5%	3%
Hidalgo	17%	49%	20%	7%	7%
Jalisco	25%	49%	18%	6%	2%
Michoacán	24%	52%	17%	3%	3%
Morelos	17%	55%	23%	3%	3%
Nayarit	29%	47%	18%	6%	
Nuevo León	24%	49%	21%	3%	2%
Oaxaca	23%	46%	26%	4%	1%
Puebla	20%	52%	17%	6%	4%
Querétaro	14%	52%	25%	5%	4%
Quintana Roo	19%	45%	26%	4%	4%
San Luis Potosí	26%	42%	28%		3%
Sinaloa	28%	53%	14%	3%	2%
Sonora	36%	32%	28%	3%	1%
Tabasco	32%	38%	22%	6%	3%
Tamaulipas	28%	41%	22%	4%	4%
Tlaxcala	11%	44%	39%		6%
Veracruz Norte	27%	47%	18%	3%	5%
Veracruz Sur	36%	30%	23%	4%	8%
Yucatán	23%	48%	21%	4%	4%
Zacatecas	36%	36%	16%	7%	3%
Nacional	24%	47%	21%	5%	4%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A9. Distribución porcentual de las personas encuestadas que recibieron alguna vacuna en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	44%	48%
Baja California	44%	47%
Baja California Sur	33%	63%
Campeche	52%	43%
Chiapas	57%	36%
Chihuahua	53%	40%
Coahuila	55%	38%
Colima	42%	54%
CDMX Norte	41%	52%
CDMX Sur	42%	50%
Durango	42%	53%
México Oriente	47%	45%
México Poniente	43%	49%
Guanajuato	42%	51%
Guerrero	55%	44%
Hidalgo	44%	47%
Jalisco	47%	45%
Michoacán	33%	52%
Morelos	37%	57%
Nayarit	41%	35%
Nuevo León	44%	49%
Oaxaca	43%	48%
Puebla	40%	52%
Querétaro	43%	51%
Quintana Roo	49%	42%
San Luis Potosí	42%	53%
Sinaloa	34%	56%
Sonora	40%	56%
Tabasco	55%	38%
Tamaulipas	44%	45%
Tlaxcala	56%	39%
Veracruz Norte	41%	53%
Veracruz Sur	51%	38%
Yucatán	52%	42%
Zacatecas	28%	64%
Nacional	44%	48%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 8%.

ENMP-IMSS Cuadro A10. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue realizada alguna toma de glucosa en sangre en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	70%	28%
Baja California	53%	42%
Baja California Sur	44%	48%
Campeche	63%	37%
Chiapas	71%	24%
Chihuahua	56%	41%
Coahuila	72%	26%
Colima	68%	30%
CDMX Norte	62%	35%
CDMX Sur	72%	27%
Durango	65%	32%
México Oriente	64%	34%
México Poniente	63%	34%
Guanajuato	69%	26%
Guerrero	61%	36%
Hidalgo	60%	38%
Jalisco	61%	36%
Michoacán	62%	36%
Morelos	61%	37%
Nayarit	82%	18%
Nuevo León	55%	41%
Oaxaca	63%	30%
Puebla	60%	36%
Querétaro	68%	30%
Quintana Roo	65%	32%
San Luis Potosí	69%	27%
Sinaloa	55%	42%
Sonora	50%	47%
Tabasco	51%	44%
Tamaulipas	58%	39%
Tlaxcala	50%	50%
Veracruz Norte	59%	37%
Veracruz Sur	72%	26%
Yucatán	61%	36%
Zacatecas	67%	28%
Nacional	63%	34%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 3%.

ENMP-IMSS Cuadro A11. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue revisada la presión arterial en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	86%	13%
Baja California	80%	19%
Baja California Sur	70%	19%
Campeche	91%	9%
Chiapas	81%	17%
Chihuahua	74%	23%
Coahuila	86%	13%
Colima	88%	10%
CDMX Norte	82%	16%
CDMX Sur	83%	16%
Durango	80%	18%
México Oriente	84%	15%
México Poniente	83%	17%
Guanajuato	87%	10%
Guerrero	83%	15%
Hidalgo	85%	14%
Jalisco	83%	16%
Michoacán	86%	14%
Morelos	86%	12%
Nayarit	94%	6%
Nuevo León	76%	21%
Oaxaca	83%	12%
Puebla	81%	17%
Querétaro	85%	15%
Quintana Roo	84%	14%
San Luis Potosí	84%	14%
Sinaloa	75%	20%
Sonora	71%	26%
Tabasco	85%	12%
Tamaulipas	78%	19%
Tlaxcala	83%	17%
Veracruz Norte	80%	18%
Veracruz Sur	89%	9%
Yucatán	78%	21%
Zacatecas	88%	7%
Nacional	82%	16%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A12. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue tomado el peso y talla en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	83%	16%
Baja California	84%	15%
Baja California Sur	78%	19%
Campeche	91%	9%
Chiapas	95%	5%
Chihuahua	81%	18%
Coahuila	88%	12%
Colima	90%	10%
CDMX Norte	82%	16%
CDMX Sur	79%	20%
Durango	85%	14%
México Oriente	84%	15%
México Poniente	83%	16%
Guanajuato	92%	6%
Guerrero	91%	8%
Hidalgo	91%	8%
Jalisco	80%	18%
Michoacán	91%	7%
Morelos	85%	14%
Nayarit	88%	12%
Nuevo León	73%	25%
Oaxaca	86%	11%
Puebla	86%	13%
Querétaro	84%	15%
Quintana Roo	88%	10%
San Luis Potosí	86%	12%
Sinaloa	81%	17%
Sonora	79%	17%
Tabasco	92%	6%
Tamaulipas	85%	14%
Tlaxcala	100%	
Veracruz Norte	80%	18%
Veracruz Sur	89%	11%
Yucatán	77%	22%
Zacatecas	91%	6%
Nacional	83%	15%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A13. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue realizada alguna medición de colesterol en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	36%	60%
Baja California	21%	73%
Baja California Sur	19%	70%
Campeche	22%	74%
Chiapas	29%	67%
Chihuahua	31%	65%
Coahuila	29%	67%
Colima	32%	64%
CDMX Norte	28%	69%
CDMX Sur	31%	66%
Durango	35%	62%
México Oriente	34%	63%
México Poniente	36%	60%
Guanajuato	34%	61%
Guerrero	38%	58%
Hidalgo	24%	72%
Jalisco	30%	65%
Michoacán	36%	60%
Morelos	28%	70%
Nayarit	41%	59%
Nuevo León	27%	68%
Oaxaca	25%	69%
Puebla	24%	71%
Querétaro	24%	72%
Quintana Roo	36%	59%
San Luis Potosí	32%	58%
Sinaloa	31%	67%
Sonora	19%	72%
Tabasco	22%	72%
Tamaulipas	29%	65%
Tlaxcala	33%	67%
Veracruz Norte	28%	68%
Veracruz Sur	13%	81%
Yucatán	35%	60%
Zacatecas	27%	67%
Nacional	30%	66%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 4%.

ENMP-IMSS Cuadro A14. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue proporcionada información sobre nutrición en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	55%	44%
Baja California	44%	55%
Baja California Sur	56%	41%
Campeche	63%	37%
Chiapas	60%	40%
Chihuahua	44%	53%
Coahuila	43%	55%
Colima	54%	42%
CDMX Norte	41%	56%
CDMX Sur	41%	57%
Durango	55%	43%
México Oriente	46%	52%
México Poniente	44%	53%
Guanajuato	53%	43%
Guerrero	67%	32%
Hidalgo	64%	35%
Jalisco	40%	56%
Michoacán	47%	48%
Morelos	47%	52%
Nayarit	65%	35%
Nuevo León	35%	62%
Oaxaca	64%	30%
Puebla	48%	49%
Querétaro	47%	50%
Quintana Roo	46%	49%
San Luis Potosí	45%	49%
Sinaloa	48%	50%
Sonora	31%	64%
Tabasco	58%	37%
Tamaulipas	48%	47%
Tlaxcala	67%	33%
Veracruz Norte	52%	45%
Veracruz Sur	47%	53%
Yucatán	44%	51%
Zacatecas	42%	55%
Nacional	46%	51%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 3%.

ENMP-IMSS Cuadro A15. Distribución porcentual de las personas encuestadas que les fue proporcionada información sobre salud sexual y reproductiva en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	45%	49%
Baja California	45%	51%
Baja California Sur	52%	37%
Campeche	50%	48%
Chiapas	60%	40%
Chihuahua	38%	57%
Coahuila	44%	54%
Colima	62%	36%
CDMX Norte	41%	53%
CDMX Sur	43%	52%
Durango	47%	46%
México Oriente	54%	43%
México Poniente	43%	52%
Guanajuato	50%	44%
Guerrero	65%	32%
Hidalgo	62%	34%
Jalisco	42%	52%
Michoacán	62%	33%
Morelos	50%	44%
Nayarit	59%	35%
Nuevo León	31%	63%
Oaxaca	64%	32%
Puebla	49%	48%
Querétaro	52%	44%
Quintana Roo	51%	45%
San Luis Potosí	53%	42%
Sinaloa	50%	50%
Sonora	42%	51%
Tabasco	60%	35%
Tamaulipas	40%	55%
Tlaxcala	67%	33%
Veracruz Norte	46%	48%
Veracruz Sur	45%	53%
Yucatán	44%	52%
Zacatecas	43%	52%
Nacional	47%	49%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 5%.

ENMP-IMSS Cuadro A16. Distribución porcentual de usuarias que les fue realizado el Papanicolaou en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No	No aplica
Aguascalientes	57%	41%	1%
Baja California	48%	48%	4%
Baja California Sur	62%	38%	
Campeche	55%	38%	7%
Chiapas	53%	47%	
Chihuahua	48%	45%	6%
Coahuila	54%	41%	4%
Colima	51%	46%	3%
CDMX Norte	58%	39%	2%
CDMX Sur	58%	40%	3%
Durango	57%	41%	2%
México Oriente	54%	42%	3%
México Poniente	50%	46%	3%
Guanajuato	62%	34%	4%
Guerrero	41%	53%	6%
Hidalgo	67%	32%	
Jalisco	48%	49%	3%
Michoacán	57%	41%	3%
Morelos	46%	53%	1%
Nayarit	70%	30%	
Nuevo León	60%	36%	3%
Oaxaca	57%	35%	8%
Puebla	55%	44%	2%
Querétaro	57%	38%	5%
Quintana Roo	58%	40%	2%
San Luis Potosí	69%	26%	6%
Sinaloa	39%	59%	2%
Sonora	53%	42%	2%
Tabasco	67%	32%	
Tamaulipas	51%	47%	
Tlaxcala	70%	30%	
Veracruz Norte	56%	39%	4%
Veracruz Sur	57%	38%	4%
Yucatán	55%	42%	2%
Zacatecas	49%	47%	4%
Nacional	55%	41%	3%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A17. Distribución porcentual de usuarias que les fue realizada una exploración de mama en su última visita al servicio de PREVENIMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No	No aplica
Aguascalientes	57%	42%	1%
Baja California	54%	43%	2%
Baja California Sur	57%	43%	
Campeche	69%	31%	
Chiapas	67%	33%	
Chihuahua	39%	55%	5%
Coahuila	54%	44%	2%
Colima	51%	41%	5%
CDMX Norte	59%	38%	2%
CDMX Sur	56%	41%	2%
Durango	50%	48%	1%
México Oriente	56%	42%	1%
México Poniente	52%	46%	2%
Guanajuato	63%	34%	2%
Guerrero	55%	43%	2%
Hidalgo	61%	38%	
Jalisco	53%	43%	3%
Michoacán	49%	46%	5%
Morelos	58%	41%	1%
Nayarit	60%	40%	
Nuevo León	46%	50%	3%
Oaxaca	68%	28%	5%
Puebla	51%	47%	2%
Querétaro	61%	36%	3%
Quintana Roo	48%	50%	2%
San Luis Potosí	61%	37%	2%
Sinaloa	47%	51%	2%
Sonora	48%	48%	
Tabasco	58%	39%	3%
Tamaulipas	53%	43%	2%
Tlaxcala	70%	30%	
Veracruz Norte	60%	37%	2%
Veracruz Sur	57%	40%	2%
Yucatán	50%	47%	1%
Zacatecas	55%	45%	
Nacional	55%	43%	2%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A18. Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas sobre la efectividad de PREVENIMSS respecto a : Realizar acciones de promoción para mejorar la salud de los derechohabientes por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Muy efectivo	Efectivo	Regular	Poco efectivo	Nada efectivo
Aguascalientes	21%	40%	23%	7%	4%
Baja California	22%	38%	21%	9%	2%
Baja California Sur	19%	42%	25%	7%	2%
Campeche	15%	30%	32%	14%	2%
Chiapas	17%	40%	33%	5%	
Chihuahua	16%	34%	28%	8%	4%
Coahuila	21%	37%	26%	8%	2%
Colima	34%	35%	19%	7%	3%
CDMX Norte	16%	38%	28%	10%	3%
CDMX Sur	16%	38%	26%	10%	4%
Durango	21%	39%	22%	9%	3%
México Oriente	13%	38%	29%	10%	5%
México Poniente	14%	38%	29%	8%	5%
Guanajuato	16%	39%	24%	9%	5%
Guerrero	25%	42%	18%	7%	4%
Hidalgo	16%	40%	27%	9%	3%
Jalisco	16%	37%	28%	9%	4%
Michoacán	14%	42%	31%	8%	1%
Morelos	22%	36%	29%	5%	4%
Nayarit	21%	41%	24%	12%	
Nuevo León	21%	37%	24%	6%	3%
Oaxaca	18%	37%	31%	7%	4%
Puebla	15%	37%	29%	10%	5%
Querétaro	13%	39%	29%	9%	4%
Quintana Roo	13%	38%	29%	10%	4%
San Luis Potosí	22%	36%	22%	8%	7%
Sinaloa	26%	39%	19%	9%	2%
Sonora	24%	40%	21%	5%	3%
Tabasco	22%	40%	24%	7%	2%
Tamaulipas	19%	37%	24%	8%	3%
Tlaxcala	15%	27%	36%	9%	6%
Veracruz Norte	17%	39%	24%	11%	3%
Veracruz Sur	21%	40%	23%	5%	2%
Yucatán	18%	34%	28%	10%	3%
Zacatecas	27%	26%	29%	10%	4%
Nacional	18%	38%	26%	9%	4%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 6%.

ENMP-IMSS Cuadro A19. Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas sobre la efectividad de PREVENIMSS respecto a : La detección temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión u obesidad por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Muy efectivo	Efectivo	Regular	Poco efectivo	Nada efectivo
Aguascalientes	25%	41%	19%	7%	3%
Baja California	25%	39%	19%	6%	3%
Baja California Sur	28%	30%	26%	7%	
Campeche	19%	33%	27%	12%	1%
Chiapas	21%	42%	25%	5%	1%
Chihuahua	19%	41%	23%	6%	4%
Coahuila	25%	39%	24%	6%	2%
Colima	39%	29%	21%	7%	1%
CDMX Norte	17%	39%	24%	9%	4%
CDMX Sur	19%	39%	21%	8%	4%
Durango	22%	39%	24%	7%	3%
México Oriente	17%	40%	23%	10%	5%
México Poniente	18%	40%	25%	7%	3%
Guanajuato	20%	43%	23%	7%	3%
Guerrero	25%	42%	19%	6%	4%
Hidalgo	18%	41%	27%	7%	3%
Jalisco	20%	39%	23%	9%	4%
Michoacán	22%	37%	25%	11%	
Morelos	25%	38%	25%	5%	4%
Nayarit	12%	50%	24%	15%	
Nuevo León	24%	39%	19%	6%	3%
Oaxaca	16%	45%	27%	7%	1%
Puebla	18%	37%	24%	10%	5%
Querétaro	18%	40%	25%	6%	4%
Quintana Roo	17%	40%	29%	5%	4%
San Luis Potosí	24%	34%	24%	4%	7%
Sinaloa	26%	44%	19%	4%	2%
Sonora	25%	41%	20%	5%	2%
Tabasco	29%	36%	25%	4%	2%
Tamaulipas	23%	40%	21%	7%	3%
Tlaxcala	12%	30%	36%	12%	3%
Veracruz Norte	18%	41%	24%	7%	3%
Veracruz Sur	20%	40%	20%	7%	4%
Yucatán	20%	40%	22%	9%	3%
Zacatecas	29%	33%	21%	8%	3%
Nacional	21%	40%	23%	8%	3%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 5%.

ENMP-IMSS Cuadro A20. Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas sobre la efectividad de PREVENIMSS respecto a : La orientación para una buena nutrición por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Muy efectivo	Efectivo	Regular	Poco efectivo	Nada efectivo
Aguascalientes	20%	34%	24%	9%	6%
Baja California	22%	30%	23%	11%	6%
Baja California Sur	19%	28%	25%	18%	4%
Campeche	17%	26%	30%	15%	4%
Chiapas	21%	40%	25%	7%	4%
Chihuahua	16%	34%	26%	9%	6%
Coahuila	19%	33%	28%	9%	6%
Colima	28%	34%	19%	10%	6%
CDMX Norte	12%	31%	26%	13%	9%
CDMX Sur	13%	31%	25%	13%	9%
Durango	15%	35%	26%	11%	7%
México Oriente	11%	31%	28%	12%	10%
México Poniente	12%	32%	28%	12%	8%
Guanajuato	14%	38%	22%	11%	7%
Guerrero	18%	38%	22%	9%	8%
Hidalgo	15%	32%	27%	13%	7%
Jalisco	13%	29%	26%	14%	9%
Michoacán	11%	31%	29%	17%	10%
Morelos	19%	34%	22%	13%	7%
Nayarit	12%	44%	18%	15%	9%
Nuevo León	19%	33%	23%	9%	6%
Oaxaca	15%	33%	34%	8%	7%
Puebla	14%	29%	27%	15%	9%
Querétaro	12%	28%	31%	12%	10%
Quintana Roo	15%	31%	29%	11%	7%
San Luis Potosí	17%	26%	29%	14%	8%
Sinaloa	19%	40%	21%	5%	8%
Sonora	22%	31%	24%	9%	7%
Tabasco	26%	34%	27%	7%	3%
Tamaulipas	20%	35%	24%	10%	5%
Tlaxcala	6%	21%	55%	6%	12%
Veracruz Norte	13%	34%	30%	11%	6%
Veracruz Sur	18%	29%	27%	8%	7%
Yucatán	17%	29%	28%	12%	6%
Zacatecas	22%	26%	22%	15%	8%
Nacional	15%	32%	26%	12%	8%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. La no respuesta a nivel nacional fue de 7%, CDMX Sur, Nuevo León y Veracruz Sur con al menos 9%.

ENMP-IMSS Cuadro A21. Distribución porcentual de la percepción de las personas encuestadas sobre la efectividad de PREVENIMSS respecto a : La orientación para la salud sexual y reproductiva de los derechohabientes por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Muy efectivo	Efectivo	Regular	Poco efectivo	Nada efectivo
Aguascalientes	20%	36%	20%	8%	4%
Baja California	22%	35%	21%	6%	3%
Baja California Sur	23%	35%	19%	12%	4%
Campeche	18%	29%	31%	11%	2%
Chiapas	20%	42%	20%	9%	2%
Chihuahua	16%	37%	22%	9%	4%
Coahuila	17%	36%	26%	8%	5%
Colima	34%	36%	15%	4%	4%
CDMX Norte	14%	34%	25%	10%	7%
CDMX Sur	15%	33%	22%	10%	5%
Durango	16%	36%	25%	7%	5%
México Oriente	13%	36%	26%	10%	7%
México Poniente	14%	35%	24%	9%	5%
Guanajuato	16%	35%	24%	8%	5%
Guerrero	26%	37%	21%	9%	4%
Hidalgo	17%	38%	25%	8%	6%
Jalisco	14%	32%	25%	11%	6%
Michoacán	19%	28%	33%	8%	4%
Morelos	21%	31%	24%	10%	5%
Nayarit	15%	44%	18%	15%	3%
Nuevo León	19%	32%	21%	7%	5%
Oaxaca	15%	40%	31%	4%	5%
Puebla	15%	32%	28%	11%	6%
Querétaro	15%	32%	28%	9%	6%
Quintana Roo	16%	30%	28%	7%	8%
San Luis Potosí	21%	28%	23%	14%	7%
Sinaloa	21%	38%	21%	6%	6%
Sonora	21%	36%	22%	6%	6%
Tabasco	28%	32%	25%	5%	4%
Tamaulipas	18%	37%	24%	8%	4%
Tlaxcala	12%	24%	39%	12%	9%
Veracruz Norte	14%	38%	25%	7%	5%
Veracruz Sur	18%	36%	21%	9%	4%
Yucatán	16%	34%	25%	10%	6%
Zacatecas	21%	30%	21%	16%	4%
Nacional	16%	34%	24%	9%	5%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. La no respuesta a nivel nacional fue de 11%, CDMX Sur y Nuevo León con al menos 16%.

ENMP-IMSS Cuadro A22. Distribución porcentual del diagnóstico por Covid-19 de las personas encuestadas o de algún miembro de su vivienda, de junio a septiembre 2021 por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	11%	88%
Baja California	7%	92%
Baja California Sur	26%	74%
Campeche	21%	78%
Chiapas	29%	71%
Chihuahua	9%	90%
Coahuila	11%	88%
Colima	28%	72%
CDMX Norte	18%	81%
CDMX Sur	17%	82%
Durango	12%	87%
México Oriente	20%	79%
México Poniente	15%	85%
Guanajuato	10%	89%
Guerrero	27%	72%
Hidalgo	15%	83%
Jalisco	16%	83%
Michoacán	23%	76%
Morelos	19%	81%
Nayarit	24%	76%
Nuevo León	20%	79%
Oaxaca	18%	81%
Puebla	19%	80%
Querétaro	15%	84%
Quintana Roo	19%	80%
San Luis Potosí	12%	88%
Sinaloa	23%	76%
Sonora	7%	92%
Tabasco	27%	72%
Tamaulipas	17%	82%
Tlaxcala	10%	90%
Veracruz Norte	20%	79%
Veracruz Sur	26%	73%
Yucatán	20%	79%
Zacatecas	11%	88%
Nacional	16%	83%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A23. Distribución porcentual de la persona diagnosticada con Covid-19 en la vivienda por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Usted	Otra persona
Aguascalientes	45%	55%
Baja California	57%	43%
Baja California Sur	48%	52%
Campeche	43%	52%
Chiapas	41%	48%
Chihuahua	45%	51%
Coahuila	52%	44%
Colima	44%	56%
CDMX Norte	40%	59%
CDMX Sur	41%	58%
Durango	42%	53%
México Oriente	46%	52%
México Poniente	52%	47%
Guanajuato	42%	57%
Guerrero	43%	57%
Hidalgo	55%	44%
Jalisco	47%	51%
Michoacán	47%	50%
Morelos	41%	55%
Nayarit	50%	50%
Nuevo León	42%	56%
Oaxaca	53%	47%
Puebla	43%	55%
Querétaro	57%	42%
Quintana Roo	54%	46%
San Luis Potosí	24%	65%
Sinaloa	52%	45%
Sonora	47%	53%
Tabasco	47%	53%
Tamaulipas	51%	48%
Tlaxcala	50%	25%
Veracruz Norte	52%	48%
Veracruz Sur	49%	51%
Yucatán	46%	54%
Zacatecas	48%	52%
Nacional	46%	53%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%, San Luis Potosí con 12% y Tlaxcala con 25%.

ENMP-IMSS Cuadro A24. Distribución porcentual de la vacunación contra Covid-19 de las personas encuestadas por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Ha recibido la vacuna de una sola dosis	Ha recibido la primera dosis de las dos necesarias	Ha recibido las dos dosis	Ninguna
Aguascalientes	8%	15%	71%	6%
Baja California	36%	3%	56%	4%
Baja California Sur	8%	20%	60%	11%
Campeche	3%	34%	60%	4%
Chiapas	12%	34%	43%	11%
Chihuahua	6%	9%	80%	4%
Coahuila	9%	26%	56%	7%
Colima	18%	19%	53%	9%
CDMX Norte	6%	23%	63%	7%
CDMX Sur	7%	17%	67%	8%
Durango	9%	26%	59%	4%
México Oriente	11%	35%	41%	13%
México Poniente	8%	32%	52%	7%
Guanajuato	7%	15%	61%	15%
Guerrero	9%	9%	74%	9%
Hidalgo	11%	25%	56%	7%
Jalisco	14%	25%	52%	8%
Michoacán	18%	16%	59%	5%
Morelos	13%	25%	54%	6%
Nayarit	10%	31%	57%	2%
Nuevo León	10%	25%	57%	8%
Oaxaca	18%	33%	43%	5%
Puebla	7%	11%	59%	22%
Querétaro	15%	44%	35%	5%
Quintana Roo	8%	20%	64%	8%
San Luis Potosí	12%	31%	52%	3%
Sinaloa	14%	12%	71%	2%
Sonora	12%	17%	66%	3%
Tabasco	11%	33%	45%	10%
Tamaulipas	7%	19%	70%	4%
Tlaxcala	7%	15%	71%	7%
Veracruz Norte	16%	22%	53%	8%
Veracruz Sur	15%	28%	44%	12%
Yucatán	11%	18%	66%	4%
Zacatecas	15%	15%	67%	3%
Nacional	10%	22%	58%	8%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A25. Distribución porcentual del tipo de vacuna recibida contra Covid-19 por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Pfizer	AstraZeneca	Sinovac	Cansino	Sputnik V	Moderna	Johnson & Johnson	Otra
Aguascalientes	26%	43%	24%	6%				
Baja California	45%	7%	9%	7%		1%	29%	
Baja California Sur	28%	54%	14%	3%			1%	
Campeche	30%	48%	20%		1%			
Chiapas	27%	60%	4%	10%				
Chihuahua	81%	11%	2%	2%		1%	2%	
Coahuila	50%	37%	5%	6%				
Colima	34%	44%	5%	15%				
CDMX Norte	21%	36%	6%	3%	33%			
CDMX Sur	23%	41%	6%	5%	25%			
Durango	60%	29%	5%	5%				
México Oriente	10%	58%	13%	5%	10%	3%		
México Poniente	34%	33%	7%	4%	12%	10%		
Guanajuato	40%	39%	14%	6%				
Guerrero	26%	20%	45%	8%				
Hidalgo	26%	44%	22%	7%	1%			
Jalisco	42%	34%	7%	10%		7%		
Michoacán	60%	15%	5%	18%			1%	
Morelos	47%	35%	6%	11%	2%			
Nayarit	25%	45%	23%	8%				
Nuevo León	32%	39%	18%	4%		6%		
Oaxaca	39%	37%	8%	16%				
Puebla	40%	30%	21%	8%				
Querétaro	27%	61%	4%	7%				
Quintana Roo	22%	73%	2%	3%				
San Luis Potosí	38%	53%	2%	5%				
Sinaloa	25%	36%	25%	13%				
Sonora	53%	34%	6%	2%			5%	
Tabasco	39%	42%	12%	5%				
Tamaulipas	68%	10%	15%	4%		1%	1%	
Tlaxcala	27%	35%	30%	8%				
Veracruz Norte	53%	24%	8%	15%				
Veracruz Sur	25%	51%	10%	12%				
Yucatán	24%	63%	3%	9%				
Zacatecas	37%	36%	16%	11%				
Nacional	35%	37%	11%	6%	7%	2%	1%	

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A26. Distribución porcentual de lo que significa para las personas encuestadas el estar vacunado contra Covid-19: Ya no se va a contagiar por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No	No sé
Aguascalientes	37%	38%	23%
Baja California	31%	38%	29%
Baja California Sur	32%	42%	25%
Campeche	35%	44%	18%
Chiapas	34%	47%	18%
Chihuahua	34%	33%	31%
Coahuila	35%	38%	25%
Colima	35%	42%	21%
CDMX Norte	30%	44%	24%
CDMX Sur	30%	47%	22%
Durango	34%	40%	23%
México Oriente	31%	42%	24%
México Poniente	29%	43%	26%
Guanajuato	33%	38%	27%
Guerrero	46%	29%	24%
Hidalgo	32%	42%	24%
Jalisco	30%	42%	26%
Michoacán	31%	44%	23%
Morelos	38%	38%	21%
Nayarit	25%	53%	18%
Nuevo León	31%	40%	26%
Oaxaca	27%	53%	19%
Puebla	31%	43%	25%
Querétaro	33%	43%	22%
Quintana Roo	31%	40%	28%
San Luis Potosí	28%	41%	29%
Sinaloa	39%	35%	23%
Sonora	27%	41%	28%
Tabasco	29%	44%	24%
Tamaulipas	32%	39%	27%
Tlaxcala	24%	46%	27%
Veracruz Norte	35%	39%	24%
Veracruz Sur	33%	41%	23%
Yucatán	30%	50%	19%
Zacatecas	31%	39%	27%
Nacional	32%	42%	25%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de la respuesta *No quiero responder* fue de 2% a nivel nacional.

ENMP-IMSS Cuadro A27. Distribución porcentual de lo que significa para las personas encuestadas el estar vacunado contra Covid-19: Se siente más seguro(a) para trabajar fuera de su casa por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No	No aplica
Aguascalientes	76%	15%	3%
Baja California	75%	16%	4%
Baja California Sur	78%	12%	
Campeche	67%	23%	5%
Chiapas	69%	19%	2%
Chihuahua	77%	14%	3%
Coahuila	77%	14%	3%
Colima	68%	22%	5%
CDMX Norte	69%	20%	5%
CDMX Sur	67%	21%	5%
Durango	73%	17%	4%
México Oriente	68%	20%	4%
México Poniente	70%	21%	4%
Guanajuato	76%	15%	3%
Guerrero	70%	17%	4%
Hidalgo	67%	21%	4%
Jalisco	72%	17%	4%
Michoacán	72%	16%	3%
Morelos	75%	18%	3%
Nayarit	75%	13%	8%
Nuevo León	71%	17%	5%
Oaxaca	71%	19%	2%
Puebla	72%	18%	3%
Querétaro	70%	19%	4%
Quintana Roo	72%	17%	3%
San Luis Potosí	75%	14%	3%
Sinaloa	73%	19%	2%
Sonora	75%	15%	4%
Tabasco	70%	19%	2%
Tamaulipas	73%	16%	3%
Tlaxcala	70%	19%	3%
Veracruz Norte	70%	19%	5%
Veracruz Sur	66%	23%	4%
Yucatán	64%	23%	6%
Zacatecas	74%	15%	2%
Nacional	71%	18%	4%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 7%, Baja California Sur y Chiapas con 10%.

ENMP-IMSS Cuadro A28. Distribución porcentual de lo que significa para las personas encuestadas el estar vacunado contra Covid-19: En caso de que se contagie el efecto será menor y no requerirá hospitalización por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No	No sé
Aguascalientes	74%	5%	20%
Baja California	68%	6%	25%
Baja California Sur	68%	10%	22%
Campeche	78%	2%	18%
Chiapas	69%	5%	27%
Chihuahua	65%	8%	26%
Coahuila	71%	7%	21%
Colima	83%	3%	13%
CDMX Norte	73%	6%	20%
CDMX Sur	73%	5%	22%
Durango	70%	6%	24%
México Oriente	69%	7%	23%
México Poniente	69%	7%	23%
Guanajuato	67%	6%	26%
Guerrero	74%	3%	21%
Hidalgo	71%	5%	23%
Jalisco	73%	6%	20%
Michoacán	69%	5%	24%
Morelos	74%	3%	22%
Nayarit	60%	18%	20%
Nuevo León	71%	5%	23%
Oaxaca	73%	6%	22%
Puebla	72%	6%	21%
Querétaro	69%	6%	24%
Quintana Roo	67%	9%	23%
San Luis Potosí	71%	5%	24%
Sinaloa	75%	3%	20%
Sonora	64%	7%	26%
Tabasco	71%	6%	22%
Tamaulipas	69%	7%	23%
Tlaxcala	68%	5%	27%
Veracruz Norte	71%	7%	22%
Veracruz Sur	71%	5%	24%
Yucatán	69%	7%	23%
Zacatecas	73%	3%	24%
Nacional	71%	6%	22%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de la respuesta *No quiero responder* fue de 1% a nivel nacional.

ENMP-IMSS Cuadro A29. Distribución porcentual de lo que significa para las personas encuestadas el estar vacunado contra Covid-19: Vacunarse no tiene ningún efecto por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No	No sé
Aguascalientes	44%	41%	12%
Baja California	45%	38%	15%
Baja California Sur	48%	33%	12%
Campeche	43%	47%	5%
Chiapas	47%	42%	10%
Chihuahua	48%	34%	15%
Coahuila	46%	39%	12%
Colima	40%	47%	10%
CDMX Norte	42%	42%	13%
CDMX Sur	41%	44%	13%
Durango	46%	38%	14%
México Oriente	47%	38%	12%
México Poniente	45%	39%	14%
Guanajuato	43%	41%	13%
Guerrero	45%	37%	16%
Hidalgo	47%	38%	13%
Jalisco	40%	44%	13%
Michoacán	40%	41%	15%
Morelos	51%	35%	10%
Nayarit	45%	33%	18%
Nuevo León	43%	38%	15%
Oaxaca	41%	43%	12%
Puebla	42%	41%	15%
Querétaro	41%	43%	13%
Quintana Roo	46%	35%	17%
San Luis Potosí	43%	41%	14%
Sinaloa	47%	34%	16%
Sonora	45%	35%	14%
Tabasco	46%	39%	12%
Tamaulipas	45%	38%	15%
Tlaxcala	35%	41%	16%
Veracruz Norte	46%	38%	14%
Veracruz Sur	46%	40%	12%
Yucatán	43%	42%	13%
Zacatecas	45%	39%	12%
Nacional	44%	40%	13%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de la respuesta *No quiero responder* fue de 3% a nivel nacional.

ENMP-IMSS Cuadro A30. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: El uso de cubre bocas por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	98%	2%
Baja California	99%	1%
Baja California Sur	97%	
Campeche	99%	
Chiapas	100%	
Chihuahua	99%	1%
Coahuila	100%	
Colima	100%	
CDMX Norte	99%	1%
CDMX Sur	99%	
Durango	99%	1%
México Oriente	99%	1%
México Poniente	99%	1%
Guanajuato	99%	1%
Guerrero	100%	
Hidalgo	99%	1%
Jalisco	99%	
Michoacán	99%	1%
Morelos	98%	2%
Nayarit	100%	
Nuevo León	99%	1%
Oaxaca	99%	1%
Puebla	99%	1%
Querétaro	98%	1%
Quintana Roo	99%	1%
San Luis Potosí	99%	
Sinaloa	99%	1%
Sonora	98%	2%
Tabasco	100%	
Tamaulipas	99%	1%
Tlaxcala	100%	
Veracruz Norte	99%	
Veracruz Sur	99%	
Yucatán	99%	
Zacatecas	100%	
Nacional	99%	1%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A31. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: Uso de gel por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	98%	2%
Baja California	98%	2%
Baja California Sur	100%	
Campeche	99%	
Chiapas	99%	1%
Chihuahua	97%	3%
Coahuila	99%	1%
Colima	100%	
CDMX Norte	99%	1%
CDMX Sur	99%	1%
Durango	98%	2%
México Oriente	98%	2%
México Poniente	98%	2%
Guanajuato	98%	2%
Guerrero	100%	
Hidalgo	98%	2%
Jalisco	98%	2%
Michoacán	97%	3%
Morelos	99%	1%
Nayarit	100%	
Nuevo León	99%	1%
Oaxaca	100%	
Puebla	99%	1%
Querétaro	97%	2%
Quintana Roo	99%	1%
San Luis Potosí	97%	1%
Sinaloa	98%	2%
Sonora	99%	1%
Tabasco	100%	
Tamaulipas	98%	1%
Tlaxcala	100%	
Veracruz Norte	99%	1%
Veracruz Sur	99%	1%
Yucatán	99%	1%
Zacatecas	99%	1%
Nacional	99%	1%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A32. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: El lavado de manos por lo menos 20 segundos por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	96%	4%
Baja California	97%	2%
Baja California Sur	93%	7%
Campeche	96%	1%
Chiapas	97%	3%
Chihuahua	96%	3%
Coahuila	97%	3%
Colima	99%	
CDMX Norte	98%	2%
CDMX Sur	97%	2%
Durango	97%	3%
México Oriente	97%	2%
México Poniente	97%	3%
Guanajuato	96%	3%
Guerrero	96%	3%
Hidalgo	97%	3%
Jalisco	95%	4%
Michoacán	95%	4%
Morelos	99%	1%
Nayarit	93%	7%
Nuevo León	97%	2%
Oaxaca	95%	4%
Puebla	97%	3%
Querétaro	98%	2%
Quintana Roo	97%	3%
San Luis Potosí	96%	1%
Sinaloa	95%	3%
Sonora	96%	3%
Tabasco	98%	2%
Tamaulipas	97%	2%
Tlaxcala	100%	
Veracruz Norte	98%	2%
Veracruz Sur	95%	4%
Yucatán	97%	3%
Zacatecas	93%	6%
Nacional	97%	3%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo y/o a que no se muestra la no respuesta.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A33. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: La vacunación contra Covid-19 en los mayores de 50 años por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	93%	6%
Baja California	93%	6%
Baja California Sur	86%	7%
Campeche	96%	2%
Chiapas	91%	7%
Chihuahua	93%	6%
Coahuila	93%	5%
Colima	90%	9%
CDMX Norte	94%	4%
CDMX Sur	95%	4%
Durango	95%	4%
México Oriente	93%	5%
México Poniente	94%	5%
Guanajuato	90%	8%
Guerrero	93%	5%
Hidalgo	92%	6%
Jalisco	90%	7%
Michoacán	95%	4%
Morelos	95%	4%
Nayarit	93%	7%
Nuevo León	93%	5%
Oaxaca	97%	2%
Puebla	92%	6%
Querétaro	91%	7%
Quintana Roo	90%	7%
San Luis Potosí	96%	3%
Sinaloa	96%	2%
Sonora	91%	6%
Tabasco	88%	10%
Tamaulipas	92%	6%
Tlaxcala	97%	
Veracruz Norte	93%	6%
Veracruz Sur	88%	9%
Yucatán	94%	5%
Zacatecas	96%	2%
Nacional	93%	5%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A34. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: El distanciamiento social de 1.5 metros por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	89%	10%
Baja California	94%	5%
Baja California Sur	97%	2%
Campeche	96%	2%
Chiapas	84%	15%
Chihuahua	92%	6%
Coahuila	93%	5%
Colima	96%	4%
CDMX Norte	92%	7%
CDMX Sur	91%	8%
Durango	92%	7%
México Oriente	91%	8%
México Poniente	93%	7%
Guanajuato	90%	9%
Guerrero	94%	5%
Hidalgo	92%	7%
Jalisco	90%	8%
Michoacán	90%	10%
Morelos	90%	10%
Nayarit	96%	
Nuevo León	94%	5%
Oaxaca	95%	4%
Puebla	93%	6%
Querétaro	94%	5%
Quintana Roo	96%	4%
San Luis Potosí	96%	3%
Sinaloa	92%	6%
Sonora	92%	6%
Tabasco	92%	6%
Tamaulipas	92%	7%
Tlaxcala	93%	3%
Veracruz Norte	93%	6%
Veracruz Sur	95%	4%
Yucatán	96%	3%
Zacatecas	91%	8%
Nacional	92%	7%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A35. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: No recibir visitas por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	64%	33%
Baja California	67%	30%
Baja California Sur	73%	24%
Campeche	74%	21%
Chiapas	72%	28%
Chihuahua	67%	31%
Coahuila	68%	29%
Colima	80%	20%
CDMX Norte	75%	23%
CDMX Sur	76%	22%
Durango	68%	29%
México Oriente	74%	25%
México Poniente	77%	21%
Guanajuato	67%	30%
Guerrero	73%	24%
Hidalgo	72%	25%
Jalisco	69%	29%
Michoacán	73%	26%
Morelos	75%	23%
Nayarit	61%	39%
Nuevo León	71%	26%
Oaxaca	72%	25%
Puebla	75%	23%
Querétaro	75%	23%
Quintana Roo	74%	23%
San Luis Potosí	69%	27%
Sinaloa	75%	22%
Sonora	69%	29%
Tabasco	74%	23%
Tamaulipas	72%	26%
Tlaxcala	79%	17%
Veracruz Norte	75%	24%
Veracruz Sur	80%	18%
Yucatán	77%	21%
Zacatecas	65%	31%
Nacional	72%	25%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A36. Distribución porcentual de las personas encuestadas que en el último mes en su hogar o rutina diaria han aplicado medidas preventivas contra Covid-19: Pruebas para detección de Covid-19 por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	50%	49%
Baja California	49%	49%
Baja California Sur	71%	29%
Campeche	54%	42%
Chiapas	45%	53%
Chihuahua	47%	52%
Coahuila	49%	49%
Colima	62%	38%
CDMX Norte	62%	37%
CDMX Sur	64%	35%
Durango	51%	49%
México Oriente	58%	41%
México Poniente	57%	43%
Guanajuato	50%	48%
Guerrero	59%	41%
Hidalgo	49%	50%
Jalisco	57%	41%
Michoacán	59%	40%
Morelos	58%	41%
Nayarit	54%	43%
Nuevo León	58%	41%
Oaxaca	56%	43%
Puebla	50%	48%
Querétaro	59%	40%
Quintana Roo	58%	42%
San Luis Potosí	50%	49%
Sinaloa	59%	38%
Sonora	51%	48%
Tabasco	60%	40%
Tamaulipas	54%	45%
Tlaxcala	38%	62%
Veracruz Norte	53%	46%
Veracruz Sur	53%	45%
Yucatán	54%	44%
Zacatecas	47%	52%
Nacional	56%	43%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. La no respuesta a nivel nacional fue de 1%.

ENMP-IMSS Tabla A37. Distribución porcentual del peso actual de las personas encuestadas por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Menos de 40 kg	De 41 a 45 kg	De 46 a 50 kg	De 51 a 55 kg	De 56 a 60 kg	De 61 a 65 kg	De 66 a 70 kg	De 71 a 75 kg	De 76 a 80 kg	De 81 a 85 kg	De 86 a 90 kg	De 91 a 95 kg	De 96 a 100 kg	De 101 a 105 kg	De 106 a 110 kg	De 111 a 115 kg	De 116 a 120 kg	Más de 120 kg
Aguascalientes	1%	3%	4%	9%	11%	11%	12%	13%	9%	9%	5%	5%	2%	1%	1%	1%	2%	
Baja California	1%	1%	2%	6%	7%	10%	10%	12%	10%	10%	8%	6%	5%	2%	1%	2%	5%	
Baja California Sur	3%	3%	5%	3%	10%	14%	11%	8%	11%	14%	8%	8%	4%				1%	
Campeche	1%		8%	11%	9%	15%	14%	7%	7%	10%	4%	4%	5%	3%	1%	1%		
Chiapas	1%	4%	5%	17%	15%	6%	10%	10%	6%	8%	6%	3%		1%	3%	1%	3%	
Chihuahua	1%	2%	4%	6%	8%	9%	12%	13%	10%	10%	6%	7%	2%	3%	2%	3%	3%	
Coahuila	1%	3%	3%	6%	11%	11%	11%	13%	10%	10%	6%	6%	2%	2%	1%	1%	2%	
Colima	3%	3%	3%	5%	16%	19%	9%	12%	9%	5%	6%	5%	2%	2%	1%		1%	
CDMX Norte	1%	4%	5%	10%	12%	14%	13%	12%	9%	8%	4%	4%	1%	1%	1%	1%	1%	
CDMX Sur	1%	4%	6%	11%	13%	15%	11%	12%	8%	7%	3%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	
Durango	1%	2%	3%	8%	9%	11%	12%	12%	11%	11%	5%	6%	3%	2%	1%	1%	2%	
México Oriente	1%	3%	6%	11%	11%	16%	12%	11%	9%	8%	5%	3%	1%	1%		1%	1%	
México Poniente	1%	3%	5%	12%	14%	15%	12%	12%	9%	7%	4%	3%	1%	1%	1%	1%	1%	
Guanajuato	1%	3%	5%	7%	10%	11%	13%	14%	9%	8%	6%	5%	2%	3%	1%	1%	1%	
Guerrero	1%	2%	7%	5%	15%	15%	14%	10%	12%	5%	7%	3%	1%	1%	2%	1%		
Hidalgo	1%	4%	6%	10%	14%	14%	12%	12%	7%	7%	4%	4%	1%	1%				
Jalisco	1%	2%	4%	8%	11%	12%	11%	13%	11%	8%	5%	5%	3%	2%	1%	1%	2%	
Michoacán	1%	1%	1%	5%	5%	12%	14%	12%	14%	9%	7%	3%	5%	3%	1%		3%	3%
Morelos	2%	3%	7%	14%	15%	13%	11%	11%	11%	3%	6%	3%	1%				1%	
Nayarit		2%	7%	14%	12%	12%	12%	12%	10%	2%	7%	5%						5%
Nuevo León	1%	2%	4%	7%	8%	12%	13%	13%	9%	10%	6%	6%	3%	2%	2%	1%	3%	
Oaxaca	1%	4%	8%	11%	18%	9%	14%	13%	7%	6%	3%		2%	1%	1%			
Puebla	1%	1%	4%	7%	13%	14%	15%	11%	12%	7%	6%	3%	2%	1%	1%	1%		1%
Querétaro	1%	3%	8%	10%	13%	12%	13%	13%	9%	6%	3%	3%	1%	2%	1%			1%
Quintana Roo	1%	3%	4%	12%	10%	15%	10%	16%	12%	4%	3%	5%	1%	2%	1%	1%	1%	1%
San Luis Potosí		3%	6%	11%	11%	19%	11%	12%	11%	5%	5%	4%	1%	1%				1%
Sinaloa	1%	2%	3%	8%	6%	14%	11%	13%	12%	10%	5%	5%	3%	4%	2%			2%
Sonora	1%	2%	4%	5%	11%	8%	13%	11%	12%	8%	6%	5%	4%	3%	2%			3%
Tabasco	1%	2%	6%	10%	12%	14%	12%	12%	9%	8%	3%	4%	2%	2%	1%	1%	1%	1%
Tamaulipas	1%	1%	4%	7%	9%	12%	11%	13%	11%	9%	5%	6%	4%	2%	2%	2%	2%	2%
Tlaxcala		5%	10%	17%	12%	7%	5%	7%	17%	10%	2%	2%	2%				2%	
Veracruz Norte	1%	4%	5%	9%	11%	14%	13%	13%	8%	7%	5%	4%	3%	1%				1%
Veracruz Sur	1%	3%	3%	9%	16%	16%	13%	11%	12%	4%	4%	2%	2%	1%	2%	1%	1%	1%
Yucatán	1%	3%	8%	11%	13%	13%	9%	12%	10%	6%	3%	4%	2%	2%	1%	1%	2%	2%
Zacatecas	2%	3%	5%	11%	7%	13%	14%	15%	9%	4%	7%	4%	1%	2%			1%	2%
Nacional	1%	3%	5%	9%	11%	13%	12%	12%	9%	8%	5%	4%	2%	2%	1%	1%	1%	1%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A38. Distribución porcentual de la talla actual de las personas encuestadas por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Menos de 140 cm	De 141 a 145 cm	De 146 a 150 cm	De 151 a 155 cm	De 156 a 160 cm	De 161 a 165 cm	De 166 a 170 cm	De 171 a 175 cm	De 176 a 180 cm	De 181 a 185 cm	De 186 a 190 cm
Aguascalientes	3%	1%	4%	12%	21%	18%	17%	12%	8%	2%	1%
Baja California	5%	1%	4%	12%	21%	19%	16%	11%	8%	3%	2%
Baja California Sur	1%		5%	19%	23%	25%	18%	6%	3%		
Campeche	3%	3%	11%	21%	24%	12%	12%	11%	2%	1%	
Chiapas	6%	1%	10%	19%	23%	13%	7%	14%	5%	2%	
Chihuahua	3%		5%	11%	20%	22%	18%	10%	7%	3%	1%
Coahuila	4%		4%	11%	21%	21%	16%	11%	6%	2%	1%
Colima	5%		9%	14%	25%	19%	14%	8%	3%	3%	1%
CDMX Norte	2%	1%	9%	14%	23%	18%	16%	9%	5%	2%	1%
CDMX Sur	4%	1%	7%	15%	23%	17%	16%	9%	5%	2%	1%
Durango	4%		3%	8%	23%	19%	18%	12%	7%	3%	2%
México Oriente	3%	1%	8%	16%	23%	17%	16%	8%	5%	1%	1%
México Poniente	4%	1%	8%	12%	26%	16%	16%	10%	5%	2%	1%
Guanajuato	3%	1%	5%	12%	21%	19%	16%	12%	7%	3%	1%
Guerrero	1%	1%	7%	18%	29%	17%	14%	10%	2%	1%	
Hidalgo	4%	1%	7%	17%	24%	16%	18%	7%	4%	1%	
Jalisco	3%		3%	9%	19%	19%	19%	14%	8%	4%	1%
Michoacán	4%		4%	9%	16%	20%	24%	14%	4%	2%	3%
Morelos	3%		9%	15%	25%	20%	16%	6%	2%	2%	1%
Nayarit	7%		2%	2%	19%	21%	29%	5%	14%		
Nuevo León	5%	1%	5%	12%	23%	18%	17%	10%	5%	3%	1%
Oaxaca	3%	1%	13%	20%	21%	18%	14%	6%	2%	1%	
Puebla	3%	2%	9%	16%	23%	17%	16%	8%	4%	1%	
Querétaro	4%	1%	6%	13%	24%	17%	17%	10%	6%	2%	
Quintana Roo	5%	2%	9%	15%	24%	13%	17%	8%	5%		
San Luis Potosí	5%	1%	5%	16%	18%	21%	19%	7%	7%		1%
Sinaloa	4%	1%	2%	6%	23%	21%	16%	16%	7%	4%	1%
Sonora	2%	1%	3%	10%	22%	21%	17%	11%	8%	3%	1%
Tabasco	5%	1%	12%	16%	21%	15%	16%	8%	5%	1%	
Tamaulipas	3%	1%	5%	13%	22%	17%	16%	12%	6%	2%	
Tlaxcala	2%		12%	12%	29%	17%	15%	5%	7%		
Veracruz Norte	2%	1%	7%	15%	26%	18%	14%	10%	5%	2%	
Veracruz Sur	5%	1%	10%	17%	28%	22%	8%	8%	2%		1%
Yucatán	5%	5%	14%	17%	22%	13%	13%	7%	3%	1%	
Zacatecas	2%	1%	3%	10%	22%	19%	18%	17%	6%	2%	1%
Nacional	4%	1%	7%	13%	23%	18%	16%	10%	6%	2%	1%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. No se muestran las categorías “De 191 a 195 cm”, “De 196 a 200 cm” y “Más de 200 cm” ya que registraron menos de 1%.

ENMP-IMSS Cuadro A39. Distribución porcentual del número de días que las personas encuestadas realizaron alguna actividad física moderada en la última semana por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 días	No realicé ninguna actividad física moderada
Aguascalientes	16%	12%	15%	7%	11%	3%	4%	29%
Baja California	19%	12%	10%	7%	9%	4%	4%	31%
Baja California Sur	19%	9%	16%	7%	8%	8%	5%	22%
Campeche	14%	7%	9%	10%	5%	4%	4%	38%
Chiapas	20%	10%	10%	4%	9%	6%	6%	32%
Chihuahua	16%	13%	13%	6%	11%	2%	4%	29%
Coahuila	20%	14%	14%	5%	9%	3%	4%	28%
Colima	17%	14%	19%	2%	14%	1%	4%	25%
CDMX Norte	16%	11%	14%	6%	10%	4%	5%	31%
CDMX Sur	18%	12%	13%	7%	10%	5%	6%	27%
Durango	17%	13%	12%	8%	9%	3%	4%	31%
México Oriente	18%	11%	13%	6%	8%	4%	5%	31%
México Poniente	19%	12%	13%	7%	7%	3%	4%	30%
Guanajuato	17%	13%	14%	7%	11%	4%	3%	27%
Guerrero	26%	10%	12%	5%	7%	3%	5%	30%
Hidalgo	17%	12%	15%	6%	10%	4%	5%	27%
Jalisco	15%	13%	18%	6%	9%	5%	5%	25%
Michoacán	22%	8%	13%	8%	9%	4%	7%	29%
Morelos	19%	14%	13%	9%	9%	2%	2%	30%
Nayarit	13%	10%	5%	13%	5%	5%	5%	41%
Nuevo León	18%	11%	14%	5%	9%	4%	4%	29%
Oaxaca	20%	10%	12%	6%	9%	5%	5%	29%
Puebla	21%	12%	13%	8%	6%	4%	4%	28%
Querétaro	18%	15%	13%	7%	9%	4%	5%	25%
Quintana Roo	14%	11%	13%	6%	11%	5%	7%	27%
San Luis Potosí	21%	12%	16%	10%	7%	3%	2%	27%
Sinaloa	18%	10%	17%	6%	9%	1%	4%	32%
Sonora	17%	12%	13%	6%	13%	2%	5%	29%
Tabasco	18%	8%	13%	5%	9%	3%	4%	33%
Tamaulipas	17%	12%	13%	5%	9%	3%	5%	30%
Tlaxcala	33%	8%	15%	8%	10%	5%	8%	10%
Veracruz Norte	17%	12%	14%	7%	9%	5%	5%	29%
Veracruz Sur	19%	13%	14%	6%	5%	4%	6%	28%
Yucatán	18%	11%	13%	7%	8%	4%	6%	28%
Zacatecas	19%	13%	9%	9%	9%	3%	6%	28%
Nacional	18%	12%	14%	7%	9%	4%	5%	29%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD estuvo entre el 1%-8%.

ENMP-IMSS Cuadro A40. Distribución porcentual del tiempo que le tomó a las personas encuestadas realizar alguna actividad física moderada en la última semana por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	1 a 15 minutos	16 a 30 minutos	31 a 45 minutos	46 a 60 minutos	Más de 60 minutos
Aguascalientes	7%	11%	5%	24%	51%
Baja California	9%	10%	6%	22%	49%
Baja California Sur	10%	2%	6%	24%	54%
Campeche	13%	11%	9%	26%	36%
Chiapas	7%	15%	10%	17%	47%
Chihuahua	5%	11%	7%	23%	49%
Coahuila	8%	14%	3%	23%	48%
Colima	6%	17%	4%	26%	44%
CDMX Norte	8%	14%	6%	26%	44%
CDMX Sur	8%	11%	5%	24%	49%
Durango	8%	10%	4%	27%	46%
México Oriente	8%	11%	5%	25%	48%
México Poniente	6%	13%	5%	24%	49%
Guanajuato	6%	14%	6%	22%	49%
Guerrero	5%	13%	6%	25%	48%
Hidalgo	7%	14%	6%	22%	48%
Jalisco	6%	12%	6%	25%	48%
Michoacán	8%	16%	5%	22%	46%
Morelos	7%	11%	5%	24%	49%
Nayarit	10%	19%		29%	43%
Nuevo León	7%	11%	6%	25%	47%
Oaxaca	9%	17%	4%	26%	40%
Puebla	8%	13%	7%	25%	45%
Querétaro	7%	13%	5%	24%	49%
Quintana Roo	5%	10%	4%	29%	48%
San Luis Potosí	4%	5%	8%	27%	55%
Sinaloa	8%	10%	2%	27%	50%
Sonora	7%	11%	7%	22%	50%
Tabasco	6%	14%	5%	20%	52%
Tamaulipas	9%	10%	6%	20%	51%
Tlaxcala	9%	9%	6%	22%	47%
Veracruz Norte	8%	11%	5%	24%	50%
Veracruz Sur	3%	14%	6%	25%	50%
Yucatán	7%	12%	5%	24%	48%
Zacatecas	5%	13%	4%	28%	47%
Nacional	7%	12%	6%	24%	48%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 6%.

ENMP-IMSS Cuadro A41. Distribución porcentual del número de días que las personas encuestadas realizaron alguna actividad física vigorosa en la última semana por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	1 día	2 días	3 días	4 días	5 días	6 días	7 días	No realicé ninguna actividad física vigorosa
Aguascalientes	16%	9%	6%	2%	3%	1%	1%	54%
Baja California	14%	8%	4%	2%	4%	1%	1%	55%
Baja California Sur	16%	4%	10%	1%	4%	1%	4%	49%
Campeche	7%	6%	2%	3%	2%		2%	58%
Chiapas	20%	7%	5%	2%	1%	1%	2%	53%
Chihuahua	14%	8%	4%	3%	3%	1%	1%	56%
Coahuila	15%	8%	6%	3%	3%	1%	1%	54%
Colima	11%	7%	7%		5%	1%	1%	54%
CDMX Norte	14%	7%	6%	2%	4%	1%	1%	58%
CDMX Sur	16%	7%	6%	2%	3%	2%	2%	56%
Durango	16%	6%	5%	2%	4%	1%	1%	54%
México Oriente	18%	8%	5%	2%	3%	1%	1%	53%
México Poniente	17%	7%	5%	3%	2%	1%	1%	56%
Guanajuato	18%	6%	5%	2%	3%	1%	1%	57%
Guerrero	20%	9%	4%	2%	3%		1%	53%
Hidalgo	16%	7%	7%	3%	3%	1%	1%	54%
Jalisco	15%	9%	6%	2%	4%	1%	1%	55%
Michoacán	14%	9%	9%	2%	3%		2%	54%
Morelos	18%	8%	5%	2%	2%		1%	55%
Nayarit	16%	3%	3%	3%			3%	68%
Nuevo León	13%	6%	5%	2%	3%	1%	1%	57%
Oaxaca	19%	8%	5%	3%	2%	2%	1%	52%
Puebla	19%	6%	5%	3%	2%	1%	1%	55%
Querétaro	14%	9%	7%	2%	3%	1%	1%	53%
Quintana Roo	14%	10%	6%	4%	4%	2%	1%	46%
San Luis Potosí	24%	8%	5%	6%	1%	2%	1%	49%
Sinaloa	10%	9%	6%	1%	1%	1%	1%	60%
Sonora	13%	5%	8%	4%	5%		2%	54%
Tabasco	14%	7%	4%	2%	2%	1%	1%	56%
Tamaulipas	15%	7%	4%	3%	2%	1%	1%	54%
Tlaxcala	16%	19%	3%	3%		3%	3%	51%
Veracruz Norte	17%	7%	7%	2%	3%	1%	1%	55%
Veracruz Sur	13%	5%	7%	2%	1%	1%	2%	60%
Yucatán	15%	8%	6%	4%	3%	1%	2%	55%
Zacatecas	12%	9%	4%	2%	4%		2%	56%
Nacional	16%	7%	6%	2%	3%	1%	1%	55%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD estuvo entre el 3%-19%.

ENMP-IMSS Cuadro A42. Distribución porcentual del tiempo que le tomó a las personas encuestadas realizar alguna actividad física vigorosa en la última semana por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	1 a 15 minutos	16 a 30 minutos	31 a 45 minutos	46 a 60 minutos	Más de 60 minutos
Aguascalientes	5%	15%	4%	26%	49%
Baja California	7%	13%	4%	23%	50%
Baja California Sur		12%	4%	38%	46%
Campeche	9%	14%	9%	27%	41%
Chiapas	6%	15%	9%	21%	47%
Chihuahua	4%	9%	4%	28%	53%
Coahuila	5%	13%	4%	30%	47%
Colima	3%	9%	3%	38%	44%
CDMX Norte	5%	11%	6%	30%	45%
CDMX Sur	5%	12%	5%	27%	49%
Durango	4%	15%	5%	26%	48%
México Oriente	6%	12%	5%	26%	48%
México Poniente	5%	13%	5%	26%	48%
Guanajuato	5%	18%	4%	26%	45%
Guerrero	4%	9%	7%	29%	52%
Hidalgo	5%	11%	6%	27%	48%
Jalisco	4%	11%	6%	31%	46%
Michoacán	8%	4%	4%	25%	59%
Morelos	4%	17%	1%	25%	49%
Nayarit		40%		10%	40%
Nuevo León	6%	11%	5%	29%	45%
Oaxaca	5%	10%	11%	27%	42%
Puebla	6%	14%	5%	29%	43%
Querétaro	5%	12%	4%	28%	48%
Quintana Roo	2%	13%	1%	30%	52%
San Luis Potosí	5%	10%	3%	34%	46%
Sinaloa	7%	14%		25%	48%
Sonora	4%	8%	6%	27%	53%
Tabasco	3%	12%	2%	25%	57%
Tamaulipas	6%	13%	4%	28%	47%
Tlaxcala		12%		18%	71%
Veracruz Norte	7%	13%	4%	24%	50%
Veracruz Sur	2%	12%	2%	33%	51%
Yucatán	5%	14%	3%	27%	48%
Zacatecas	3%	7%	1%	30%	56%
Nacional	5%	13%	5%	27%	48%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 10%.

ENMP-IMSS Cuadro A43. Distribución porcentual del cambio de peso en las personas encuestadas durante el confinamiento por la contingencia sanitaria por Covid-19 por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí, subí de peso	Sí, bajé de peso	No, me mantuve en mí mismo peso
Aguascalientes	49%	12%	37%
Baja California	50%	13%	35%
Baja California Sur	43%	22%	32%
Campeche	49%	20%	27%
Chiapas	49%	17%	33%
Chihuahua	52%	15%	31%
Coahuila	50%	14%	35%
Colima	46%	16%	34%
CDMX Norte	53%	18%	27%
CDMX Sur	53%	17%	28%
Durango	44%	17%	37%
México Oriente	50%	17%	30%
México Poniente	48%	15%	34%
Guanajuato	50%	15%	33%
Guerrero	54%	18%	26%
Hidalgo	50%	18%	29%
Jalisco	49%	15%	34%
Michoacán	48%	15%	35%
Morelos	57%	17%	26%
Nayarit	49%	23%	29%
Nuevo León	47%	15%	35%
Oaxaca	48%	22%	28%
Puebla	51%	17%	30%
Querétaro	51%	17%	28%
Quintana Roo	50%	17%	33%
San Luis Potosí	57%	13%	23%
Sinaloa	43%	19%	35%
Sonora	52%	14%	33%
Tabasco	45%	21%	31%
Tamaulipas	44%	18%	35%
Tlaxcala	42%	22%	36%
Veracruz Norte	46%	21%	31%
Veracruz Sur	51%	17%	30%
Yucatán	52%	19%	27%
Zacatecas	48%	14%	34%
Nacional	50%	17%	31%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 7%.

ENMP-IMSS. Cuadro A44. Distribución porcentual del peso promedio actual, talla promedio, realización de actividad física y aumento de peso en la contingencia sanitaria de las personas encuestadas por OOAD¹

OOAD	Peso promedio (kg)	Talla (m)	Realización de actividad física en la última semana (moderada o vigorosa, o ambas)	IMC promedio
Nacional	75.70	1.61	69%	29.20
Baja California	83.22	1.62	66%	32.30
Nuevo León	79.55	1.61	67%	31.41
Chihuahua	81.43	1.63	67%	31.01
Tamaulipas	79.70	1.62	65%	30.74
Yucatán	74.32	1.57	70%	30.64
Campeche	75.60	1.59	55%	30.28
Tabasco	75.57	1.59	64%	30.49
Sinaloa	79.41	1.63	67%	30.55
Coahuila	78.34	1.62	69%	30.52
Durango	79.07	1.63	67%	30.27
Sonora	80.04	1.64	69%	30.16
Chiapas	74.49	1.58	67%	30.12
Quintana Roo	74.86	1.59	68%	30.18
Michoacán	78.60	1.63	72%	30.69
Colima	74.78	1.59	72%	30.25
Veracruz Sur	74.07	1.58	68%	30.32
Guanajuato	77.42	1.62	70%	29.77
Jalisco	78.23	1.64	73%	29.35
Aguascalientes	76.95	1.63	70%	29.30
Veracruz Norte	75.09	1.61	70%	29.23
CDMX Norte	74.38	1.61	68%	28.84
CDMX Sur	73.42	1.60	71%	28.87
México Oriente	73.33	1.60	68%	28.89
San Luis Potosí	73.48	1.60	73%	29.64
Nayarit	74.90	1.62	59%	29.96
México Poniente	72.86	1.60	68%	28.86
Hidalgo	72.56	1.60	71%	28.97
Tlaxcala	72.54	1.60	87%	28.65
Zacatecas	75.28	1.64	69%	28.42
Oaxaca	70.72	1.58	68%	28.61
Querétaro	72.83	1.61	73%	28.33
Morelos	71.67	1.60	70%	28.49
Baja California Sur	73.20	1.61	74%	28.36
Puebla	70.96	1.60	70%	28.10
Guerrero	69.55	1.61	71%	26.96

1. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A45. Distribución porcentual de las personas encuestadas que actualmente fuman por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	16%	83%
Baja California	9%	91%
Baja California Sur	6%	92%
Campeche	9%	89%
Chiapas	7%	93%
Chihuahua	13%	87%
Coahuila	12%	88%
Colima	4%	95%
CDMX Norte	14%	85%
CDMX Sur	14%	85%
Durango	9%	90%
México Oriente	15%	84%
México Poniente	14%	86%
Guanajuato	13%	87%
Guerrero	7%	93%
Hidalgo	13%	87%
Jalisco	12%	88%
Michoacán	13%	84%
Morelos	9%	90%
Nayarit	11%	89%
Nuevo León	12%	87%
Oaxaca	6%	93%
Puebla	11%	89%
Querétaro	15%	85%
Quintana Roo	12%	88%
San Luis Potosí	9%	91%
Sinaloa	3%	97%
Sonora	8%	91%
Tabasco	5%	94%
Tamaulipas	9%	90%
Tlaxcala	11%	89%
Veracruz Norte	9%	91%
Veracruz Sur	9%	91%
Yucatán	10%	89%
Zacatecas	14%	86%
Nacional	12%	87%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A46. Los principales padecimientos que las personas encuestadas perciben que afectan a una gran parte de la población del país (sin considerar Covid-19) por OOAD^{h/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Diabetes	Presión arterial alta	Obesidad	Desnutrición	Salud mental	Cáncer	Enfermedades gastrointestinales	Infecciones de transmisión sexual	Cardiopatías o problemas del corazón	Enfermedades del riñón
Aguascalientes	19%	17%	19%	3%	7%	11%	5%	2%	7%	9%
Baja California	20%	18%	19%	5%	6%	12%	6%	3%	7%	4%
Baja California Sur	19%	16%	20%	4%	6%	12%	4%	6%	9%	4%
Campeche	20%	18%	19%	3%	6%	12%	4%	7%	7%	6%
Chiapas	20%	16%	19%	4%	3%	12%	7%	4%	7%	7%
Chihuahua	20%	18%	19%	4%	6%	13%	5%	3%	8%	5%
Coahuila	19%	17%	19%	4%	6%	13%	5%	3%	7%	6%
Colima	20%	16%	19%	3%	8%	14%	4%	3%	7%	7%
CDMX Norte	20%	17%	19%	4%	7%	12%	6%	3%	7%	5%
CDMX Sur	20%	17%	19%	5%	6%	11%	6%	3%	8%	5%
Durango	20%	17%	19%	4%	8%	12%	5%	3%	7%	6%
México Oriente	20%	16%	19%	5%	6%	11%	6%	4%	7%	6%
México Poniente	20%	17%	19%	5%	6%	11%	6%	4%	7%	6%
Guanajuato	20%	17%	19%	4%	6%	13%	5%	3%	7%	7%
Guerrero	20%	17%	19%	3%	5%	11%	5%	4%	7%	7%
Hidalgo	20%	16%	19%	4%	6%	12%	5%	4%	7%	8%
Jalisco	20%	17%	19%	3%	8%	12%	5%	2%	6%	8%
Michoacán	19%	17%	19%	5%	7%	12%	4%	2%	6%	7%
Morelos	20%	17%	19%	4%	6%	12%	6%	3%	7%	6%
Nayarit	20%	15%	19%	6%	9%	11%	5%	5%	6%	5%
Nuevo León	20%	18%	19%	3%	6%	13%	6%	3%	8%	5%
Oaxaca	20%	16%	19%	4%	6%	12%	6%	5%	8%	5%
Puebla	20%	16%	19%	5%	6%	12%	6%	4%	7%	7%
Querétaro	20%	17%	19%	5%	7%	12%	6%	3%	6%	6%
Quintana Roo	19%	16%	19%	5%	6%	12%	5%	6%	6%	6%
San Luis Potosí	19%	16%	19%	5%	7%	11%	6%	3%	7%	7%
Sinaloa	20%	16%	19%	4%	7%	12%	4%	3%	9%	5%
Sonora	19%	18%	19%	4%	7%	13%	5%	3%	8%	4%
Tabasco	20%	16%	19%	3%	4%	11%	5%	6%	7%	8%
Tamaulipas	20%	18%	19%	3%	5%	12%	5%	4%	8%	7%
Tlaxcala	19%	17%	19%	3%	3%	11%	5%	4%	5%	13%
Veracruz Norte	20%	17%	19%	3%	5%	13%	4%	5%	7%	7%
Veracruz Sur	20%	17%	18%	3%	5%	13%	6%	5%	6%	8%
Yucatán	20%	17%	19%	4%	7%	11%	5%	5%	7%	5%
Zacatecas	20%	18%	19%	4%	7%	13%	5%	3%	6%	7%
Nacional	20%	17%	19%	4%	6%	12%	6%	3%	7%	6%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

ENMP-IMSS Cuadro A47. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen diabetes o la azúcar alta en la sangre por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	22%	77%
Baja California	38%	61%
Baja California Sur	23%	77%
Campeche	21%	79%
Chiapas	19%	79%
Chihuahua	24%	75%
Coahuila	19%	80%
Colima	22%	77%
CDMX Norte	19%	81%
CDMX Sur	22%	77%
Durango	23%	77%
México Oriente	19%	80%
México Poniente	18%	81%
Guanajuato	27%	72%
Guerrero	16%	84%
Hidalgo	16%	83%
Jalisco	26%	74%
Michoacán	20%	79%
Morelos	19%	81%
Nayarit	9%	91%
Nuevo León	32%	66%
Oaxaca	15%	83%
Puebla	16%	83%
Querétaro	14%	85%
Quintana Roo	22%	77%
San Luis Potosí	16%	83%
Sinaloa	17%	83%
Sonora	19%	81%
Tabasco	14%	86%
Tamaulipas	21%	77%
Tlaxcala	11%	89%
Veracruz Norte	20%	79%
Veracruz Sur	16%	83%
Yucatán	17%	82%
Zacatecas	17%	82%
Nacional	21%	78%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A48. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen la presión alta o hipertensión por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	37%	63%
Baja California	54%	46%
Baja California Sur	20%	80%
Campeche	36%	64%
Chiapas	22%	76%
Chihuahua	36%	64%
Coahuila	27%	73%
Colima	27%	72%
CDMX Norte	26%	74%
CDMX Sur	31%	68%
Durango	34%	66%
México Oriente	25%	75%
México Poniente	26%	73%
Guanajuato	41%	59%
Guerrero	15%	84%
Hidalgo	26%	73%
Jalisco	35%	65%
Michoacán	39%	60%
Morelos	29%	71%
Nayarit	9%	91%
Nuevo León	40%	59%
Oaxaca	17%	82%
Puebla	24%	76%
Querétaro	24%	75%
Quintana Roo	37%	62%
San Luis Potosí	21%	78%
Sinaloa	27%	73%
Sonora	35%	65%
Tabasco	28%	72%
Tamaulipas	32%	67%
Tlaxcala	28%	72%
Veracruz Norte	33%	66%
Veracruz Sur	24%	76%
Yucatán	32%	67%
Zacatecas	25%	74%
Nacional	31%	68%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 2%.

ENMP-IMSS Cuadro 49. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen sobrepeso u obesidad por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	53%	46%
Baja California	65%	35%
Baja California Sur	52%	48%
Campeche	60%	40%
Chiapas	60%	39%
Chihuahua	52%	46%
Coahuila	45%	54%
Colima	59%	40%
CDMX Norte	52%	47%
CDMX Sur	50%	49%
Durango	55%	44%
México Oriente	51%	48%
México Poniente	52%	48%
Guanajuato	55%	44%
Guerrero	55%	45%
Hidalgo	57%	42%
Jalisco	51%	48%
Michoacán	60%	39%
Morelos	51%	49%
Nayarit	38%	62%
Nuevo León	52%	47%
Oaxaca	58%	41%
Puebla	50%	49%
Querétaro	46%	53%
Quintana Roo	55%	45%
San Luis Potosí	57%	43%
Sinaloa	54%	46%
Sonora	52%	48%
Tabasco	53%	45%
Tamaulipas	51%	47%
Tlaxcala	60%	40%
Veracruz Norte	52%	47%
Veracruz Sur	57%	41%
Yucatán	53%	46%
Zacatecas	49%	49%
Nacional	53%	46%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A50. Distribución porcentual de las personas encuestadas que se han realizado una detección de diabetes (prueba del azúcar) por OOAD^{1/2}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	60%	40%
Baja California	60%	40%
Baja California Sur	52%	48%
Campeche	51%	49%
Chiapas	50%	49%
Chihuahua	55%	44%
Coahuila	57%	43%
Colima	63%	34%
CDMX Norte	54%	46%
CDMX Sur	59%	40%
Durango	64%	35%
México Oriente	58%	42%
México Poniente	53%	46%
Guanajuato	60%	40%
Guerrero	52%	48%
Hidalgo	52%	46%
Jalisco	60%	40%
Michoacán	62%	37%
Morelos	56%	44%
Nayarit	63%	38%
Nuevo León	56%	43%
Oaxaca	54%	45%
Puebla	52%	48%
Querétaro	52%	47%
Quintana Roo	60%	40%
San Luis Potosí	71%	29%
Sinaloa	63%	37%
Sonora	52%	47%
Tabasco	54%	45%
Tamaulipas	53%	46%
Tlaxcala	59%	41%
Veracruz Norte	54%	45%
Veracruz Sur	57%	43%
Yucatán	52%	48%
Zacatecas	52%	47%
Nacional	56%	43%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 4%.

ENMP-IMSS Cuadro A51. Distribución porcentual de las personas encuestadas que se han realizado una detección de hipertensión (toma de presión arterial) por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	63%	37%
Baja California	67%	33%
Baja California Sur	57%	43%
Campeche	54%	42%
Chiapas	61%	36%
Chihuahua	59%	40%
Coahuila	60%	40%
Colima	73%	24%
CDMX Norte	62%	38%
CDMX Sur	62%	37%
Durango	65%	34%
México Oriente	62%	38%
México Poniente	62%	37%
Guanajuato	66%	34%
Guerrero	64%	36%
Hidalgo	63%	36%
Jalisco	65%	35%
Michoacán	67%	32%
Morelos	58%	42%
Nayarit	55%	45%
Nuevo León	56%	42%
Oaxaca	60%	39%
Puebla	61%	38%
Querétaro	62%	38%
Quintana Roo	57%	42%
San Luis Potosí	67%	32%
Sinaloa	66%	34%
Sonora	61%	38%
Tabasco	59%	41%
Tamaulipas	54%	45%
Tlaxcala	64%	36%
Veracruz Norte	58%	42%
Veracruz Sur	66%	34%
Yucatán	57%	43%
Zacatecas	68%	32%
Nacional	61%	38%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 3%.

ENMP-IMSS Cuadro A52. Distribución porcentual de las personas encuestadas que se han realizado una detección de colesterol o triglicéridos por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	57%	42%
Baja California	63%	36%
Baja California Sur	63%	36%
Campeche	58%	41%
Chiapas	52%	48%
Chihuahua	61%	38%
Coahuila	61%	39%
Colima	57%	42%
CDMX Norte	58%	42%
CDMX Sur	63%	37%
Durango	68%	31%
México Oriente	58%	42%
México Poniente	61%	38%
Guanajuato	64%	35%
Guerrero	59%	41%
Hidalgo	58%	42%
Jalisco	61%	38%
Michoacán	63%	37%
Morelos	55%	44%
Nayarit	53%	47%
Nuevo León	63%	36%
Oaxaca	48%	50%
Puebla	55%	44%
Querétaro	55%	45%
Quintana Roo	65%	35%
San Luis Potosí	61%	38%
Sinaloa	65%	35%
Sonora	67%	32%
Tabasco	54%	45%
Tamaulipas	62%	38%
Tlaxcala	51%	49%
Veracruz Norte	61%	39%
Veracruz Sur	44%	55%
Yucatán	58%	42%
Zacatecas	55%	45%
Nacional	60%	39%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A53. Distribución porcentual de la silueta corporal que la persona encuestada percibe que se le parece en este momento por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Aguascalientes	1%	6%	10%	21%	26%	22%	10%	3%	
Baja California	1%	3%	9%	17%	26%	23%	14%	4%	2%
Baja California Sur	2%	5%	11%	16%	34%	25%	8%		
Campeche		1%	17%	22%	30%	18%	11%	1%	
Chiapas		2%	19%	24%	21%	21%	7%	6%	
Chihuahua	1%	3%	10%	21%	22%	26%	12%	4%	2%
Coahuila	1%	5%	10%	20%	26%	23%	10%	2%	1%
Colima	1%	2%	11%	24%	30%	22%	5%	3%	
CDMX Norte	1%	6%	12%	20%	25%	22%	11%	3%	1%
CDMX Sur	2%	5%	12%	20%	25%	21%	10%	3%	1%
Durango	1%	6%	10%	20%	27%	20%	13%	2%	1%
México Oriente	1%	6%	12%	22%	25%	21%	10%	2%	1%
México Poniente	1%	5%	10%	23%	29%	21%	9%	1%	
Guanajuato	1%	5%	9%	20%	26%	23%	11%	2%	1%
Guerrero	2%	7%	11%	29%	26%	18%	5%	2%	
Hidalgo	1%	5%	13%	22%	26%	21%	10%	2%	
Jalisco	1%	5%	12%	20%	26%	23%	9%	3%	1%
Michoacán	1%	3%	14%	21%	27%	16%	11%	4%	1%
Morelos	2%	4%	12%	23%	28%	22%	7%	1%	
Nayarit		15%	18%	15%	18%	24%	6%		6%
Nuevo León	1%	5%	10%	18%	26%	22%	13%	4%	1%
Oaxaca	1%	7%	12%	29%	27%	13%	9%	2%	1%
Puebla	1%	6%	13%	24%	27%	18%	9%	1%	
Querétaro	0%	7%	9%	26%	28%	17%	9%	1%	1%
Quintana Roo	1%	6%	11%	19%	22%	27%	11%	2%	1%
San Luis Potosí	1%	10%	14%	20%	26%	22%	4%	2%	2%
Sinaloa	1%	8%	8%	22%	30%	18%	9%	1%	1%
Sonora	1%	6%	9%	21%	23%	24%	12%	3%	1%
Tabasco	1%	5%	13%	23%	23%	23%	9%	2%	
Tamaulipas	1%	6%	10%	17%	25%	26%	12%	3%	1%
Tlaxcala		3%	20%	17%	26%	26%	6%	3%	
Veracruz Norte	1%	6%	12%	20%	26%	21%	10%	2%	
Veracruz Sur	1%	3%	14%	22%	25%	22%	6%	4%	1%
Yucatán	1%	4%	12%	21%	26%	20%	12%	3%	1%
Zacatecas	3%	3%	12%	22%	29%	16%	8%	4%	1%
Nacional	1%	5%	11%	21%	26%	22%	10%	2%	1%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 2%.

ENMP-IMSS Cuadro A54. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Tomar mucha agua por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	86%	13%
Baja California	89%	10%
Baja California Sur	81%	16%
Campeche	94%	6%
Chiapas	84%	14%
Chihuahua	90%	9%
Coahuila	92%	8%
Colima	90%	8%
CDMX Norte	87%	12%
CDMX Sur	83%	15%
Durango	88%	11%
México Oriente	88%	11%
México Poniente	88%	12%
Guanajuato	85%	12%
Guerrero	91%	6%
Hidalgo	88%	11%
Jalisco	89%	11%
Michoacán	89%	9%
Morelos	88%	11%
Nayarit	83%	17%
Nuevo León	90%	8%
Oaxaca	86%	13%
Puebla	86%	13%
Querétaro	83%	16%
Quintana Roo	92%	7%
San Luis Potosí	89%	10%
Sinaloa	91%	9%
Sonora	93%	6%
Tabasco	90%	8%
Tamaulipas	92%	8%
Tlaxcala	85%	15%
Veracruz Norte	91%	8%
Veracruz Sur	90%	9%
Yucatán	88%	11%
Zacatecas	85%	14%
Nacional	88%	11%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 3%.

ENMP-IMSS Cuadro A55. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Aumentar el consumo de vegetales y alimentos ricos en (por ejemplo, cereales integrales) por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	85%	13%
Baja California	86%	13%
Baja California Sur	81%	13%
Campeche	92%	6%
Chiapas	88%	10%
Chihuahua	83%	16%
Coahuila	88%	11%
Colima	93%	7%
CDMX Norte	89%	10%
CDMX Sur	86%	12%
Durango	85%	13%
México Oriente	85%	14%
México Poniente	86%	12%
Guanajuato	85%	14%
Guerrero	78%	21%
Hidalgo	85%	14%
Jalisco	88%	10%
Michoacán	88%	11%
Morelos	88%	11%
Nayarit	92%	8%
Nuevo León	86%	12%
Oaxaca	88%	11%
Puebla	84%	14%
Querétaro	82%	17%
Quintana Roo	93%	6%
San Luis Potosí	87%	10%
Sinaloa	91%	9%
Sonora	89%	11%
Tabasco	82%	17%
Tamaulipas	84%	15%
Tlaxcala	100%	
Veracruz Norte	87%	12%
Veracruz Sur	86%	13%
Yucatán	84%	14%
Zacatecas	83%	14%
Nacional	86%	13%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 6%.

ENMP-IMSS Cuadro A56. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Eliminar el consumo de comida chatarra por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	81%	17%
Baja California	86%	13%
Baja California Sur	74%	19%
Campeche	85%	9%
Chiapas	94%	6%
Chihuahua	83%	16%
Coahuila	81%	16%
Colima	88%	10%
CDMX Norte	83%	15%
CDMX Sur	85%	13%
Durango	82%	17%
México Oriente	83%	15%
México Poniente	86%	13%
Guanajuato	88%	11%
Guerrero	85%	12%
Hidalgo	85%	13%
Jalisco	85%	13%
Michoacán	88%	9%
Morelos	86%	11%
Nayarit	83%	17%
Nuevo León	82%	15%
Oaxaca	83%	17%
Puebla	84%	13%
Querétaro	86%	12%
Quintana Roo	92%	8%
San Luis Potosí	83%	14%
Sinaloa	88%	12%
Sonora	86%	13%
Tabasco	87%	11%
Tamaulipas	84%	15%
Tlaxcala	95%	5%
Veracruz Norte	88%	10%
Veracruz Sur	86%	10%
Yucatán	82%	15%
Zacatecas	90%	10%
Nacional	85%	14%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 6%.

ENMP-IMSS Cuadro A57. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Eliminar el consumo de refrescos por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	79%	18%
Baja California	85%	14%
Baja California Sur	84%	13%
Campeche	77%	17%
Chiapas	86%	14%
Chihuahua	80%	19%
Coahuila	82%	17%
Colima	86%	10%
CDMX Norte	83%	15%
CDMX Sur	84%	14%
Durango	84%	14%
México Oriente	84%	15%
México Poniente	86%	13%
Guanajuato	82%	16%
Guerrero	88%	10%
Hidalgo	85%	13%
Jalisco	84%	14%
Michoacán	81%	15%
Morelos	85%	13%
Nayarit	67%	25%
Nuevo León	77%	21%
Oaxaca	81%	18%
Puebla	82%	16%
Querétaro	81%	17%
Quintana Roo	89%	11%
San Luis Potosí	84%	11%
Sinaloa	87%	12%
Sonora	78%	22%
Tabasco	86%	12%
Tamaulipas	79%	20%
Tlaxcala	90%	10%
Veracruz Norte	87%	12%
Veracruz Sur	86%	13%
Yucatán	79%	19%
Zacatecas	86%	13%
Nacional	83%	15%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 8%.

ENMP-IMSS Cuadro A58. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Disminuir el tamaño de las porciones de mis alimentos por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	82%	17%
Baja California	86%	12%
Baja California Sur	81%	10%
Campeche	87%	9%
Chiapas	78%	22%
Chihuahua	81%	16%
Coahuila	83%	17%
Colima	85%	14%
CDMX Norte	83%	15%
CDMX Sur	80%	17%
Durango	80%	18%
México Oriente	79%	19%
México Poniente	83%	16%
Guanajuato	85%	13%
Guerrero	82%	15%
Hidalgo	84%	14%
Jalisco	84%	15%
Michoacán	73%	24%
Morelos	87%	11%
Nayarit	92%	8%
Nuevo León	83%	15%
Oaxaca	83%	16%
Puebla	84%	15%
Querétaro	82%	17%
Quintana Roo	90%	10%
San Luis Potosí	86%	13%
Sinaloa	83%	17%
Sonora	83%	16%
Tabasco	81%	17%
Tamaulipas	83%	16%
Tlaxcala	80%	20%
Veracruz Norte	83%	16%
Veracruz Sur	82%	17%
Yucatán	80%	17%
Zacatecas	80%	18%
Nacional	82%	16%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 9%.

ENMP-IMSS Cuadro A59. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Aumentar mi actividad física por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	64%	33%
Baja California	62%	34%
Baja California Sur	61%	32%
Campeche	58%	36%
Chiapas	57%	41%
Chihuahua	64%	32%
Coahuila	63%	35%
Colima	63%	32%
CDMX Norte	62%	36%
CDMX Sur	62%	35%
Durango	63%	35%
México Oriente	62%	35%
México Poniente	64%	33%
Guanajuato	66%	30%
Guerrero	69%	27%
Hidalgo	67%	30%
Jalisco	67%	31%
Michoacán	71%	25%
Morelos	62%	36%
Nayarit	50%	42%
Nuevo León	62%	34%
Oaxaca	65%	35%
Puebla	64%	35%
Querétaro	68%	29%
Quintana Roo	73%	26%
San Luis Potosí	61%	36%
Sinaloa	64%	36%
Sonora	62%	33%
Tabasco	65%	32%
Tamaulipas	64%	33%
Tlaxcala	70%	30%
Veracruz Norte	64%	34%
Veracruz Sur	66%	32%
Yucatán	62%	35%
Zacatecas	69%	27%
Nacional	64%	33%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 8%.

ENMP-IMSS Cuadro A60. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Realizar algún tipo de ejercicio o deporte por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	62%	36%
Baja California	57%	40%
Baja California Sur	58%	32%
Campeche	60%	32%
Chiapas	63%	35%
Chihuahua	60%	37%
Coahuila	58%	40%
Colima	66%	31%
CDMX Norte	61%	37%
CDMX Sur	59%	38%
Durango	56%	41%
México Oriente	57%	40%
México Poniente	63%	35%
Guanajuato	65%	34%
Guerrero	64%	34%
Hidalgo	60%	37%
Jalisco	66%	33%
Michoacán	59%	40%
Morelos	58%	37%
Nayarit	58%	33%
Nuevo León	58%	39%
Oaxaca	67%	32%
Puebla	57%	41%
Querétaro	66%	33%
Quintana Roo	71%	27%
San Luis Potosí	56%	43%
Sinaloa	63%	37%
Sonora	53%	43%
Tabasco	57%	41%
Tamaulipas	58%	39%
Tlaxcala	75%	25%
Veracruz Norte	63%	35%
Veracruz Sur	60%	38%
Yucatán	56%	41%
Zacatecas	64%	36%
Nacional	60%	37%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 10%.

ENMP-IMSS Cuadro A61. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Seguir las recomendaciones de un profesional de la salud privado (médico/nutriólogo) por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	48%	49%
Baja California	43%	53%
Baja California Sur	35%	61%
Campeche	40%	49%
Chiapas	39%	57%
Chihuahua	45%	51%
Coahuila	43%	53%
Colima	56%	42%
CDMX Norte	40%	57%
CDMX Sur	39%	57%
Durango	46%	51%
México Oriente	37%	60%
México Poniente	39%	58%
Guanajuato	44%	52%
Guerrero	39%	55%
Hidalgo	37%	61%
Jalisco	50%	47%
Michoacán	47%	48%
Morelos	46%	52%
Nayarit	75%	25%
Nuevo León	45%	51%
Oaxaca	39%	57%
Puebla	39%	57%
Querétaro	41%	57%
Quintana Roo	49%	49%
San Luis Potosí	44%	54%
Sinaloa	47%	50%
Sonora	41%	57%
Tabasco	42%	55%
Tamaulipas	43%	54%
Tlaxcala	55%	45%
Veracruz Norte	43%	54%
Veracruz Sur	44%	50%
Yucatán	40%	56%
Zacatecas	51%	45%
Nacional	42%	54%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 12%.

ENMP-IMSS Cuadro A62. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Acudir a PREVENIMSS o a medicina preventiva de mi unidad médica para vigilar mi peso por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	28%	68%
Baja California	24%	72%
Baja California Sur	23%	71%
Campeche	28%	66%
Chiapas	22%	78%
Chihuahua	23%	71%
Coahuila	19%	77%
Colima	31%	68%
CDMX Norte	26%	70%
CDMX Sur	25%	72%
Durango	30%	65%
México Oriente	27%	70%
México Poniente	28%	68%
Guanajuato	32%	64%
Guerrero	36%	61%
Hidalgo	29%	68%
Jalisco	26%	70%
Michoacán	28%	69%
Morelos	31%	65%
Nayarit	17%	67%
Nuevo León	22%	73%
Oaxaca	30%	66%
Puebla	28%	70%
Querétaro	26%	71%
Quintana Roo	33%	60%
San Luis Potosí	29%	67%
Sinaloa	19%	76%
Sonora	29%	66%
Tabasco	27%	71%
Tamaulipas	25%	69%
Tlaxcala	20%	80%
Veracruz Norte	26%	71%
Veracruz Sur	30%	69%
Yucatán	20%	77%
Zacatecas	30%	66%
Nacional	26%	70%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta por cada OOAD fue menor al 17%.

ENMP-IMSS Cuadro A63. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Tomar suplementos/licuados por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	16%	81%
Baja California	26%	72%
Baja California Sur	19%	77%
Campeche	32%	64%
Chiapas	12%	88%
Chihuahua	23%	75%
Coahuila	18%	79%
Colima	17%	80%
CDMX Norte	17%	81%
CDMX Sur	16%	81%
Durango	19%	80%
México Oriente	17%	82%
México Poniente	13%	84%
Guanajuato	16%	82%
Guerrero	16%	82%
Hidalgo	13%	84%
Jalisco	21%	77%
Michoacán	33%	65%
Morelos	20%	77%
Nayarit	33%	67%
Nuevo León	24%	74%
Oaxaca	19%	80%
Puebla	15%	83%
Querétaro	17%	82%
Quintana Roo	19%	79%
San Luis Potosí	24%	73%
Sinaloa	22%	78%
Sonora	25%	73%
Tabasco	26%	72%
Tamaulipas	23%	75%
Tlaxcala	10%	90%
Veracruz Norte	18%	79%
Veracruz Sur	19%	80%
Yucatán	19%	80%
Zacatecas	26%	73%
Nacional	19%	79%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 4%.

ENMP-IMSS Cuadro A64. Distribución porcentual de las personas encuestadas que están tomando acciones para controlar su peso: Tomar medicamentos para perder peso por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	7%	91%
Baja California	9%	90%
Baja California Sur		94%
Campeche	9%	89%
Chiapas	4%	96%
Chihuahua	10%	88%
Coahuila	10%	89%
Colima	2%	97%
CDMX Norte	10%	89%
CDMX Sur	6%	91%
Durango	7%	92%
México Oriente	7%	91%
México Poniente	6%	92%
Guanajuato	7%	91%
Guerrero	9%	88%
Hidalgo	8%	90%
Jalisco	11%	88%
Michoacán	12%	87%
Morelos	3%	95%
Nayarit	8%	92%
Nuevo León	8%	90%
Oaxaca	7%	92%
Puebla	10%	88%
Querétaro	6%	93%
Quintana Roo	10%	90%
San Luis Potosí	11%	87%
Sinaloa	13%	86%
Sonora	8%	90%
Tabasco	9%	90%
Tamaulipas	10%	88%
Tlaxcala		100%
Veracruz Norte	8%	91%
Veracruz Sur	9%	90%
Yucatán	7%	91%
Zacatecas	14%	86%
Nacional	8%	90%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 6%.

ENMP-IMSS Cuadro A65. Distribución porcentual de las personas encuestadas a las que algún médico(a) les ha dicho que tienen o tuvieron cáncer o un tumor maligno de cualquier tipo por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	7%	93%
Baja California	6%	94%
Baja California Sur	6%	94%
Campeche	2%	97%
Chiapas	4%	96%
Chihuahua	5%	95%
Coahuila	7%	93%
Colima	7%	93%
CDMX Norte	6%	93%
CDMX Sur	7%	92%
Durango	4%	95%
México Oriente	5%	94%
México Poniente	5%	94%
Guanajuato	5%	95%
Guerrero	3%	97%
Hidalgo	6%	93%
Jalisco	6%	94%
Michoacán	6%	92%
Morelos	4%	96%
Nayarit	9%	91%
Nuevo León	6%	94%
Oaxaca	4%	96%
Puebla	5%	95%
Querétaro	6%	94%
Quintana Roo	4%	96%
San Luis Potosí	7%	93%
Sinaloa	6%	94%
Sonora	7%	93%
Tabasco	3%	96%
Tamaulipas	4%	95%
Tlaxcala	6%	91%
Veracruz Norte	7%	92%
Veracruz Sur	6%	94%
Yucatán	5%	95%
Zacatecas	5%	95%
Nacional	6%	94%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 3%.

ENMP-IMSS Cuadro A66. Distribución porcentual del tipo de cáncer que tienen o tuvieron las personas encuestadas por OOAD^{h/2/3}

Organismo de Operación Administrativa Desconcentrada	CDMX Norte	Colima	Coahuila	Chihuahua	Chiapas	Campeche	Baja California Sur	Baja California	Aguascalientes
Mama	17%	67%	29%	27%	33%			8%	19%
Cérvix o cuello uterino	21%		14%	20%				28%	14%
Próstata	4%		3%	3%				10%	12%
Glándula tiroideas	10%		9%	13%				8%	7%
Ovario	7%	17%	11%	3%			75%	8%	2%
Piel (Melanoma)	12%			3%				3%	5%
Colon	5%			3%			25%	3%	2%
Riñón	1%		3%					5%	
testicular			3%	3%					
Leucemia	1%		3%					3%	4%
Linfoma de Hodgkin	1%		3%					5%	2%
Huesos	1%		6%	3%				3%	
Estómago			3%	3%					2%
Cerebro	1%		3%						
Vejiga	1%					50%			2%
Higado	1%							3%	
Endometrio	1%								2%
Mieloma									4%
Páncreas									2%
Pulmón				3%					
Matriz									2%
Carcinoma									
Bazo	1%								2%
Miomas	1%								
Linfoma								3%	
Vesícula			3%						
Ganglios						50%			
Sarcoma	1%		3%						
Senos paranasales									
Otro	5%			7%				10%	14%

	Nacional	Zacatecas	Yucatán	Veracruz Sur	Veracruz Norte
	22%	30%	33%	33%	27%
	16%		5%	33%	18%
	8%		5%		7%
	7%	20%	8%		4%
	7%		3%	11%	9%
	6%	10%	5%	11%	11%
	4%	10%	3%	11%	2%
	3%		10%		4%
	3%	10%	5%		2%
	2%		5%		4%
	2%		3%		
	1%				4%
	1%				
	1%				
	1%				
	1%		3%		
	1%				2%
	1%				2%
	1%				
	4%		3%		2%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 10%.

ENMP-IMSS Cuadro A67. Distribución porcentual de las personas encuestadas que permanentemente tienen dificultad para caminar, moverse, subir o bajar escaleras por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	16%	83%
Baja California	23%	77%
Baja California Sur	18%	80%
Campeche	16%	83%
Chiapas	20%	76%
Chihuahua	20%	79%
Coahuila	20%	79%
Colima	13%	86%
CDMX Norte	19%	80%
CDMX Sur	22%	76%
Durango	16%	84%
México Oriente	20%	79%
México Poniente	18%	82%
Guanajuato	22%	77%
Guerrero	21%	78%
Hidalgo	18%	82%
Jalisco	20%	79%
Michoacán	17%	81%
Morelos	19%	80%
Nayarit	19%	81%
Nuevo León	17%	82%
Oaxaca	15%	85%
Puebla	14%	85%
Querétaro	16%	82%
Quintana Roo	16%	82%
San Luis Potosí	15%	85%
Sinaloa	19%	79%
Sonora	14%	86%
Tabasco	15%	84%
Tamaulipas	16%	83%
Tlaxcala	27%	73%
Veracruz Norte	17%	82%
Veracruz Sur	19%	80%
Yucatán	17%	82%
Zacatecas	13%	86%
Nacional	19%	80%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 4%.

ENMP-IMSS Cuadro A68. Distribución porcentual de la frecuencia con que las personas encuestadas se han sentido nerviosas o estresadas en el último mes por OOAD^{1/2/3}

Órgano de operación administrativa desconcentrada	Muy a menudo	A menudo	De vez en cuando	Casi nunca	Nunca
Aguascalientes	20%	23%	34%	15%	8%
Baja california	20%	22%	34%	16%	8%
Baja california sur	20%	26%	38%	10%	5%
Campeche	20%	17%	37%	18%	8%
Chiapas	32%	18%	31%	13%	6%
Chihuahua	23%	20%	35%	14%	7%
Coahuila	21%	16%	36%	18%	10%
Colima	17%	23%	36%	16%	7%
CDMX norte	27%	24%	31%	13%	5%
CDMX sur	24%	21%	33%	15%	6%
Durango	20%	20%	37%	17%	6%
México oriente	24%	24%	32%	13%	6%
México poniente	21%	24%	32%	14%	8%
Guanajuato	19%	24%	33%	16%	7%
Guerrero	24%	25%	33%	13%	5%
Hidalgo	22%	23%	35%	13%	6%
Jalisco	25%	21%	31%	15%	6%
Michoacán	27%	22%	35%	10%	5%
Morelos	26%	23%	32%	14%	5%
Nayarit	19%	28%	47%	3%	3%
Nuevo león	17%	18%	37%	15%	12%
Oaxaca	17%	19%	40%	15%	9%
Puebla	24%	23%	33%	13%	6%
Querétaro	21%	22%	32%	16%	7%
Quintana roo	17%	21%	34%	16%	10%
San Luis potosí	19%	21%	41%	14%	3%
Sinaloa	21%	23%	37%	17%	2%
Sonora	19%	18%	37%	19%	9%
Tabasco	23%	21%	37%	13%	5%
Tamaulipas	20%	16%	35%	17%	10%
Tlaxcala	18%	24%	33%	15%	6%
Veracruz norte	22%	21%	38%	14%	5%
Veracruz sur	25%	19%	31%	15%	8%
Yucatán	23%	22%	35%	14%	6%
Zacatecas	25%	15%	40%	14%	6%
Nacional	22%	22%	34%	15%	7%

1 Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.

2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.

3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 3%.

ENMP-IMSS Cuadro A69. Distribución porcentual de los miembros del hogar diagnosticados con Diabetes o la azúcar alta en la sangre por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	49%	49%
Baja California	53%	46%
Baja California Sur	38%	59%
Campeche	40%	59%
Chiapas	44%	52%
Chihuahua	49%	49%
Coahuila	52%	47%
Colima	53%	45%
CDMX Norte	50%	49%
CDMX Sur	50%	49%
Durango	49%	50%
México Oriente	51%	48%
México Poniente	50%	49%
Guanajuato	53%	46%
Guerrero	51%	49%
Hidalgo	50%	48%
Jalisco	50%	49%
Michoacán	45%	51%
Morelos	50%	49%
Nayarit	56%	44%
Nuevo León	50%	48%
Oaxaca	51%	48%
Puebla	51%	48%
Querétaro	48%	49%
Quintana Roo	50%	49%
San Luis Potosí	48%	49%
Sinaloa	48%	51%
Sonora	44%	54%
Tabasco	53%	45%
Tamaulipas	51%	48%
Tlaxcala	39%	61%
Veracruz Norte	49%	50%
Veracruz Sur	46%	53%
Yucatán	49%	50%
Zacatecas	52%	47%
Nacional	50%	49%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 4%.

ENMP-IMSS Cuadro A70. Distribución porcentual de los miembros del hogar diagnosticados con Hipertensión por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	57%	41%
Baja California	61%	36%
Baja California Sur	51%	48%
Campeche	47%	52%
Chiapas	46%	50%
Chihuahua	55%	43%
Coahuila	55%	43%
Colima	54%	41%
CDMX Norte	55%	43%
CDMX Sur	56%	42%
Durango	54%	44%
México Oriente	55%	44%
México Poniente	52%	46%
Guanajuato	56%	42%
Guerrero	57%	41%
Hidalgo	55%	44%
Jalisco	57%	42%
Michoacán	52%	44%
Morelos	61%	38%
Nayarit	50%	50%
Nuevo León	51%	46%
Oaxaca	50%	49%
Puebla	54%	44%
Querétaro	49%	48%
Quintana Roo	50%	49%
San Luis Potosí	53%	45%
Sinaloa	53%	42%
Sonora	58%	41%
Tabasco	54%	44%
Tamaulipas	55%	44%
Tlaxcala	30%	70%
Veracruz Norte	57%	42%
Veracruz Sur	54%	45%
Yucatán	56%	42%
Zacatecas	59%	40%
Nacional	55%	43%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 5%.

ENMP-IMSS Cuadro A71. Distribución porcentual de los miembros del hogar diagnosticados con Sobrepeso u obesidad por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	55%	43%
Baja California	58%	40%
Baja California Sur	52%	46%
Campeche	53%	45%
Chiapas	55%	42%
Chihuahua	52%	44%
Coahuila	51%	47%
Colima	63%	35%
CDMX Norte	57%	41%
CDMX Sur	54%	43%
Durango	54%	43%
México Oriente	55%	42%
México Poniente	54%	43%
Guanajuato	54%	44%
Guerrero	51%	48%
Hidalgo	57%	40%
Jalisco	52%	45%
Michoacán	55%	42%
Morelos	59%	40%
Nayarit	38%	63%
Nuevo León	48%	50%
Oaxaca	58%	42%
Puebla	53%	44%
Querétaro	56%	42%
Quintana Roo	47%	52%
San Luis Potosí	60%	37%
Sinaloa	52%	44%
Sonora	53%	46%
Tabasco	56%	43%
Tamaulipas	48%	48%
Tlaxcala	58%	42%
Veracruz Norte	53%	44%
Veracruz Sur	58%	40%
Yucatán	55%	43%
Zacatecas	50%	46%
Nacional	54%	44%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 5%.

ENMP-IMSS Cuadro A72. Distribución porcentual de los miembros del hogar con diagnóstico de obesidad que están llevando acciones para controlar su peso por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	61%	30%
Baja California	57%	34%
Baja California Sur	53%	41%
Campeche	67%	26%
Chiapas	57%	35%
Chihuahua	55%	35%
Coahuila	54%	37%
Colima	57%	38%
CDMX Norte	55%	37%
CDMX Sur	56%	35%
Durango	57%	35%
México Oriente	54%	37%
México Poniente	55%	35%
Guanajuato	58%	33%
Guerrero	59%	33%
Hidalgo	55%	37%
Jalisco	56%	34%
Michoacán	58%	34%
Morelos	56%	35%
Nayarit	50%	33%
Nuevo León	55%	38%
Oaxaca	56%	38%
Puebla	54%	36%
Querétaro	59%	30%
Quintana Roo	57%	32%
San Luis Potosí	63%	27%
Sinaloa	62%	32%
Sonora	55%	38%
Tabasco	55%	35%
Tamaulipas	58%	34%
Tlaxcala	42%	42%
Veracruz Norte	57%	37%
Veracruz Sur	60%	37%
Yucatán	59%	33%
Zacatecas	61%	30%
Nacional	56%	35%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD estuvo entre el 5%-17%.

ENMP-IMSS Cuadro A73. Distribución porcentual de los factores que las personas encuestadas perciben que más influyen en que en México se tenga un alto número de personas con diabetes y con sobrepeso por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Malta alimentación/Hábitos alimenticios inadecuados	Consumo de comida chatarra/rápida/procesada	No realizar actividad física/ejercicio/deporte	Falta de educación/información/cultura/conciencia para la salud	Sedentarismo	El costo elevado de los alimentos/dieta	Estrés/Ansiedad/Depresión/Salud mental	Por genética/herencia	laborales, tiempos de traslado, fumar y/o beber, confinamiento	Falta de interés y autocuidado	Sin seguimiento	revisión u orientación médica/nutricional	Falta de tiempo para preparar alimentos y/o para hacer ejercicio	Obesidad/Sobrepeso	promocionales y espacios adecuados para	Otro
Aguascalientes	29%	11%	11%	9%	9%	4%	5%	3%	3%	3%	2%	2%	1%	1%	3%	
Baja California	25%	14%	12%	9%	8%	6%	5%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	3%	
Baja California Sur	28%	9%	9%	10%	14%	5%	5%	2%	4%	5%	2%		2%	2%	2%	
Campeche	28%	15%	7%	9%	8%	6%	4%	1%	2%	3%		1%	2%	1%	6%	
Chiapas	30%	14%	14%	8%	6%	2%	3%	1%	3%	3%	2%	1%	2%	1%	1%	
Chihuahua	27%	12%	11%	8%	7%	6%	6%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	3%	
Coahuila	28%	12%	14%	7%	10%	5%	3%	4%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	4%	
Colima	28%	10%	12%	11%	10%	5%	6%	3%	4%	3%	1%	1%	1%	1%	4%	
CDMX Norte	29%	12%	12%	9%	9%	5%	5%	3%	3%	3%	2%	2%	1%	1%	4%	
CDMX Sur	29%	12%	11%	9%	9%	6%	4%	3%	2%	2%	3%	2%	1%	1%	3%	
Durango	28%	10%	12%	8%	9%	5%	6%	4%	2%	3%	3%	1%	1%	1%	3%	
México Oriente	30%	11%	12%	8%	8%	5%	5%	3%	3%	2%	3%	2%	1%	1%	4%	
México Poniente	30%	10%	12%	9%	9%	5%	5%	3%	3%	3%	2%	2%	1%	1%	3%	
Guanajuato	28%	12%	13%	8%	9%	5%	5%	3%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	2%	
Guerrero	28%	18%	12%	6%	10%	3%	4%	6%	2%		1%		1%	5%		
Hidalgo	32%	10%	13%	8%	7%	6%	5%	3%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	2%	
Jalisco	27%	11%	12%	11%	8%	5%	5%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	3%	
Michoacán	29%	12%	13%	6%	10%	5%	6%	5%	3%	3%	1%	1%	1%	1%	3%	
Morelos	31%	10%	13%	9%	9%	5%	6%	3%	2%	2%	2%	2%	1%	1%	4%	
Nayarit	19%	15%	7%	7%	8%	5%	3%	2%	2%	3%		10%	2%	2%	3%	
Nuevo León	27%	13%	11%	8%	9%	5%	5%	3%	3%	2%	2%	1%	1%		4%	
Oaxaca	27%	13%	16%	6%	8%	4%	7%	4%	2%	2%	1%	1%	1%		4%	
Puebla	30%	11%	13%	9%	8%	5%	4%	4%	4%	3%	3%	1%	1%	1%	3%	
Querétaro	29%	12%	12%	9%	8%	5%	4%	3%	3%	3%	2%	2%	1%	1%	5%	
Quintana Roo	27%	12%	11%	11%	6%	7%	5%	3%	2%	3%	2%		1%	1%	5%	
San Luis Potosí	26%	12%	11%	8%	9%	2%	6%	2%	3%	2%		2%	3%	1%	5%	
Sinaloa	30%	12%	8%	7%	10%	6%	6%	4%	1%	2%	4%	1%	2%	1%	3%	
Sonora	25%	12%	15%	7%	8%	6%	3%	4%	4%	2%	2%	3%	1%	2%	2%	
Tabasco	28%	19%	12%	8%	6%	4%	4%	2%	2%	3%	3%	1%	2%		3%	
Tamaulipas	26%	12%	11%	6%	9%	7%	3%	4%	3%	2%	2%	1%	1%	1%	4%	
Tlaxcala	22%	16%	9%	7%	7%	7%	6%	3%	3%	6%	1%	1%			4%	
Veracruz Norte	29%	12%	12%	6%	10%	5%	5%	4%	2%	2%	2%	1%	1%	1%	3%	
Veracruz Sur	26%	14%	13%	8%	7%	5%	5%	3%	5%	2%	2%	1%			3%	
Yucatán	26%	15%	12%	8%	7%	6%	5%	3%	4%	2%	2%	1%	1%	1%	3%	
Zacatecas	28%	12%	12%	9%	13%	2%	6%	4%	4%	1%	1%	1%		1%	4%	
Nacional	28%	12%	12%	9%	8%	5%	5%	3%	3%	2%	2%	2%	1%	1%	3%	

1. Respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100%.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD estuvo entre el 1%-12%.

ENMP-IMSS Cuadro A74. Distribución porcentual de la percepción de trato igualitario a hombres y mujeres en las unidades médicas del IMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Sí	No
Aguascalientes	81%	10%
Baja California	83%	8%
Baja California Sur	80%	8%
Campeche	71%	16%
Chiapas	81%	12%
Chihuahua	82%	10%
Coahuila	82%	11%
Colima	81%	9%
CDMX Norte	81%	10%
CDMX Sur	81%	10%
Durango	84%	7%
México Oriente	80%	12%
México Poniente	79%	13%
Guanajuato	80%	10%
Guerrero	84%	9%
Hidalgo	80%	11%
Jalisco	83%	9%
Michoacán	82%	13%
Morelos	87%	8%
Nayarit	86%	4%
Nuevo León	82%	9%
Oaxaca	81%	11%
Puebla	74%	17%
Querétaro	78%	11%
Quintana Roo	72%	15%
San Luis Potosí	73%	17%
Sinaloa	76%	13%
Sonora	79%	8%
Tabasco	74%	13%
Tamaulipas	82%	9%
Tlaxcala	79%	7%
Veracruz Norte	80%	10%
Veracruz Sur	83%	9%
Yucatán	79%	12%
Zacatecas	81%	12%
Nacional	80%	11%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD estuvo entre el 7%-14%.

ENMP-IMSS Cuadro A75. Distribución porcentual de la percepción de trato igualitario en las unidades médicas del IMSS por OOAD ENII-IMSS 2021 y Encuesta de Medicina Preventiva IMSS 2021

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Encuesta PREVENIMSS ¿Considera que en las unidades médicas del IMSS se brinda atención igual a hombres y mujeres? Sí	Encuesta de Imagen ¿Considera que en las unidades médicas del IMSS se brinda atención igual a todas las personas usuarias? Sí
Nacional	80%	45%
Aguascalientes	81%	46%
Baja California	83%	42%
Baja California Sur	80%	50%
Campeche	71%	45%
Chiapas	81%	44%
Chihuahua	82%	43%
Coahuila	82%	47%
Colima	81%	54%
CDMX Norte	81%	48%
CDMX Sur	81%	52%
Durango	84%	40%
México Oriente	80%	45%
México Poniente	79%	46%
Guanajuato	80%	37%
Guerrero	84%	44%
Hidalgo	80%	47%
Jalisco	83%	40%
Michoacán	82%	40%
Morelos	87%	41%
Nayarit	86%	54%
Nuevo León	82%	48%
Oaxaca	81%	48%
Puebla	74%	42%
Querétaro	78%	44%
Quintana Roo	72%	42%
San Luis Potosí	73%	44%
Sinaloa	76%	41%
Sonora	79%	45%
Tabasco	74%	47%
Tamaulipas	82%	43%
Tlaxcala	79%	41%
Veracruz Norte	80%	45%
Veracruz Sur	83%	46%
Yucatán	79%	47%
Zacatecas	81%	46%

ENMP-IMSS Cuadro A76. Distribución porcentual de la comparación del servicio del IMSS con respecto a otras instituciones de salud por OOAD^{1/2/3}

Órgano de operación administrativa descentrada	Mejor que en las otras instituciones	Igual que en las otras instituciones	Peor que en las otras instituciones
Aguascalientes	23%	34%	13%
Baja california	20%	32%	16%
Baja california sur	32%	29%	12%
Campeche	16%	42%	22%
Chiapas	27%	41%	16%
Chihuahua	15%	34%	21%
Coahuila	25%	30%	17%
Colima	25%	30%	15%
CDMX norte	20%	35%	16%
CDMX sur	24%	34%	15%
Durango	29%	38%	11%
México oriente	15%	35%	21%
México poniente	18%	35%	18%
Guanajuato	16%	38%	21%
Guerrero	49%	25%	6%
Hidalgo	23%	35%	16%
Jalisco	17%	34%	19%
Michoacán	21%	32%	18%
Morelos	20%	36%	18%
Nayarit	18%	50%	7%
Nuevo león	16%	33%	19%
Oaxaca	26%	37%	11%
Puebla	12%	35%	27%
Querétaro	15%	35%	19%
Quintana roo	19%	35%	20%
San Luis potosí	28%	33%	13%
Sinaloa	27%	36%	16%
Sonora	26%	32%	15%
Tabasco	28%	40%	16%
Tamaulipas	23%	35%	16%
Tlaxcala	24%	31%	28%
Veracruz norte	17%	39%	20%
Veracruz sur	21%	40%	15%
Yucatán	17%	39%	19%
Zacatecas	17%	39%	21%
Nacional	20%	35%	18%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD estuvo entre el 16%-32%.

ENMP-IMSS Cuadro A77. Distribución porcentual de las personas encuestadas que recuerdan el nombre del director general del IMSS por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Zoé Robledo Aburto	Otro	No sé
Aguascalientes	9%	1%	88%
Baja California	7%		91%
Baja California Sur	5%		92%
Campeche	8%	1%	89%
Chiapas	23%	4%	73%
Chihuahua	7%	2%	90%
Coahuila	8%	2%	86%
Colima	9%	4%	83%
CDMX Norte	17%	1%	81%
CDMX Sur	20%	1%	77%
Durango	9%	1%	88%
México Oriente	12%	1%	86%
México Poniente	12%	1%	84%
Guanajuato	8%	3%	88%
Guerrero	8%	3%	88%
Hidalgo	10%	4%	84%
Jalisco	10%	2%	86%
Michoacán	9%	2%	85%
Morelos	9%	3%	86%
Nayarit	7%		93%
Nuevo León	8%	1%	89%
Oaxaca	13%	1%	86%
Puebla	11%	1%	87%
Querétaro	8%	1%	89%
Quintana Roo	8%	1%	90%
San Luis Potosí	14%	2%	83%
Sinaloa	9%	7%	79%
Sonora	8%	5%	84%
Tabasco	11%	1%	87%
Tamaulipas	6%	2%	90%
Tlaxcala	7%		93%
Veracruz Norte	11%	3%	84%
Veracruz Sur	6%	2%	90%
Yucatán	8%	2%	88%
Zacatecas	9%	2%	87%
Nacional	11%	2%	85%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta para cada OOAD fue menor al 5%.

ENMP-IMSS Cuadro A78. Distribución porcentual de la opinión de las personas encuestadas sobre que el IMSS extienda sus servicios médicos a otras poblaciones del país, aunque no estén asegurados por OOAD^{1/2/3}

Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
Aguascalientes	45%	29%	12%	8%	3%
Baja California	46%	26%	11%	10%	4%
Baja California Sur	49%	32%	7%		3%
Campeche	45%	27%	9%	12%	2%
Chiapas	37%	36%	9%	8%	3%
Chihuahua	40%	27%	14%	10%	5%
Coahuila	38%	32%	10%	11%	6%
Colima	51%	24%	10%	9%	2%
CDMX Norte	43%	29%	12%	9%	4%
CDMX Sur	41%	28%	11%	11%	5%
Durango	40%	28%	10%	13%	5%
México Oriente	41%	31%	11%	9%	3%
México Poniente	42%	27%	12%	9%	6%
Guanajuato	35%	29%	12%	12%	7%
Guerrero	54%	22%	8%	8%	3%
Hidalgo	41%	29%	12%	11%	4%
Jalisco	39%	26%	12%	12%	7%
Michoacán	47%	17%	14%	13%	4%
Morelos	41%	25%	13%	9%	6%
Nayarit	50%	32%	11%	4%	
Nuevo León	38%	30%	11%	10%	6%
Oaxaca	40%	33%	11%	9%	4%
Puebla	40%	29%	11%	12%	6%
Querétaro	42%	31%	10%	8%	6%
Quintana Roo	40%	31%	14%	8%	4%
San Luis Potosí	38%	28%	12%	12%	5%
Sinaloa	56%	21%	11%	6%	5%
Sonora	40%	30%	14%	8%	4%
Tabasco	46%	31%	9%	8%	2%
Tamaulipas	39%	27%	14%	10%	6%
Tlaxcala	38%	24%	7%	14%	10%
Veracruz Norte	41%	30%	11%	9%	6%
Veracruz Sur	48%	20%	16%	10%	2%
Yucatán	46%	30%	9%	7%	4%
Zacatecas	40%	26%	15%	11%	1%
Nacional	41%	28%	12%	10%	5%

1. Las cifras pueden no sumar 100% debido al redondeo.
2. Los resultados contemplan los tres niveles de atención.
3. El porcentaje de no respuesta en cada OOAD estuvo entre el 3%-10%.