

Causas prenatales de la discapacidad

¿Se presentan antes del nacimiento, por lo que se desarrollan en la vida intrauterina, es decir, en el momento que la niña o el niño se encuentra dentro del útero, se deben a diversos factores, y se dividen en:

- Prenatal genética
- Prenatal ambiental
- Prenatal inespecífica

Prenatal genética: Se considera cuando existe una causa total o parcialmente genética que da lugar a la aparición de síndromes genéticos (defectos en un gen), cromosómicos o multifactoriales y donde aparece la discapacidad intelectual por sí sola o unida a las otras discapacidades, casi siempre acompañadas de defectos congénitos.

Factores de riesgo

- Alteraciones de los genes
- Enfermedades hereditarias
- Edad de la madre
- Intervalo entre gestas y cesárea previa
- Alteraciones endocrinas de la madre (diabetes mellitus, hipotiroidismo)
- Parto prematuro y abortos previos
- Deficiencias nutricionales
- Exposición a toxinas ambientales (como plomo)
- Ingestión de fármacos teratogénicos o drogas (opiáceos, tabaco, inhalantes)
- Exposición a radiaciones



- Enfermedades infecciosas (rubéola, sarampión, sífilis, citomegalovirus, toxoplasmosis)
- Traumatismos

Prenatal ambiental: Presencia de antecedentes maternos de exposición a fármacos o sustancias tóxicas durante el embarazo como la ingestión de alcohol, drogas, la hipertermia, las infecciones fetales, la presencia de enfermedades asociadas al embarazo del tipo de la hipertensión arterial u otras afecciones de la madre, entre otras causas, donde está ausente la etiología genética.

Factores de riesgo

- Bajo nivel de ingresos económicos
- Bajo nivel educativo de los padres
- Trastornos psicológicos (depresión, ansiedad, psicosis, esquizofrenia, trastorno bipolar)
- Uso indebido de sustancias tóxicas (drogas, alcohol, tabaco)
- Padres adolescentes
- Abuso, maltrato o descuido del niño
- Ausencia o limitación de estimulación física, psicológica y social
- Carencia o restricción de consulta prenatal
- Uso indebido de medicamentos (automedicación)

Prenatal inespecífica: No se identifica la causa genética o ambiental, hay evidencia de algún factor prenatal causal que origine dismorfias (aspectos físicos distintivos en partes anatómicas que no pueden ser ubicados en un síndrome genético de los conocidos) pero que aún así éste pueda sospecharse, las malformaciones congénitas del Sistema Nervioso Central aisladas, la existencia de antecedentes de familiares afectados, así como la presencia de algunas entidades

»»



como la epilepsia no asociada a algún síndrome o el crecimiento intrauterino retardado.

El retardo en el desarrollo es multicausal y requiere de diversas acciones concretas e inmediatas en los tres niveles de prevención, además de la participación de los diferentes profesionales relacionados con el área de la salud.

TE INVITAMOS A MANTENERTE INFORMADO A TRAVÉS DE ESTE SITIO



Fuente:

- Etiología prenatal en la discapacidad intelectual en la región andina Venezolana. Rev Cubana Genet Comunit. 2011; 5 (2-3):89-97.
- Discapacidad: Factores de Riesgo y Prevención y Profesionales Relacionados. Enseñanza e Investigación en Psicología Vol. 22, N°2: 183-196. Mayo-agosto, 2017.